



Centre intégré  
de santé et de  
services sociaux de  
la Montérégie-Centre

Québec 

# Retrouver sa qualité de vie

PAS À PAS

PROTHÈSE DE GENOU



NOM : \_\_\_\_\_

Québec 

Ce document tient sa source de l'original du même nom produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le contenu a été légèrement adapté pour mieux répondre aux pratiques qui ont cours au CISSS de la Montérégie-Centre (RLS du Haut-Richelieu – Rouville). Faisant partie intégrante du continuum de soins, il constitue un guide des plus utiles pour accompagner le patient qui subit une chirurgie de la hanche ou du genou.

- Nous vous recommandons de commencer à lire ce document le plus tôt possible.
- Assurez-vous d'avoir préparé chacune des rencontres prévues dans ce cheminement, en lisant la section appropriée et en suivant nos suggestions.
- Relisez régulièrement ce document, avant, pendant et après votre hospitalisation.
- Apportez ce document avec vous lors de chaque visite avec l'équipe soignante.

#### ÉDITION

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Le présent document peut être consulté et commandé en ligne à l'adresse : <http://intranetreseau.qc.ca>

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

#### Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012

Bibliothèque et Archives Canada, 2012

ISBN : 978-2-550-66494-9 (version Word)

Les photographies contenues dans cette publication ne servent qu'à illustrer les différents sujets abordés. Les personnes y apparaissant sont des figurants.

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d'étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d'en mentionner la source.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>PASSEPORT ET DIRECTIVES GÉNÉRALES.....</b>	<b>5</b>
CONSIGNES POUR LA VISITE EN PRÉ-ADMISSION.....	5
CONSIGNES POUR VOTRE OPÉRATION.....	6
À VOTRE ARRIVÉE À L'HÔPITAL.....	7
CONSIGNES POUR VOTRE SUIVI À DOMICILE.....	7
VOTRE RÔLE.....	8
LE RÔLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR.....	9
COMPRENDRE SA PATHOLOGIE ET LA CHIRURGIE PROPOSÉE.....	9
DURÉE DE SÉJOUR.....	10
VOTRE CHEMINEMENT.....	11
CONTINUUM.....	12
<b>1- PHASE PRÉHOSPITALIÈRE.....</b>	<b>13</b>
VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR.....	13
TABLEAU SYNTHÈSE DE L'OPTIMISATION DE VOTRE SANTÉ.....	17
LA RENCONTRE DE GROUPE.....	20
L'ACCUEIL DE LA PRÉ-ADMISSION.....	21
LA VISITE EN PRÉ-ADMISSION.....	21
ENGAGEMENT MORAL.....	25
<b>2 - PHASE HOSPITALIÈRE.....</b>	<b>26</b>
VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR.....	26
LA CHIRURGIE D'UN JOUR (CDJ).....	29
LA SALLE D'OPÉRATION.....	30
L'UNITÉ DE SOINS.....	31
AUTO-INJECTION DE L'ANTICOAGULANT (SI CELA S'APPLIQUE À VOUS).....	39
LE LAVAGE DES MAINS.....	41
<b>3 - PHASE POSTHOSPITALIÈRE.....</b>	<b>47</b>
VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR.....	47
LE SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE OU LE CLSC.....	49
LE SERVICE EXTERNE DE PHYSIOTHÉRAPIE.....	49
LE RETOUR AU TRAVAIL.....	50
LA REPRISE DES ACTIVITÉS.....	51
VISITE À L'ORTHOPÉDISTE.....	52
POINTS À SURVEILLER.....	53
<b>4 - VIVRE AVEC SA PROTHÈSE.....</b>	<b>54</b>
VOTRE ORTHOPÉDISTE.....	54
VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR.....	54
FOIRE AUX QUESTIONS.....	56
<b>VOTRE RÉADAPTATION.....</b>	<b>57</b>
<b>PROGRAMME D'EXERCICES POUR UNE CHIRURGIE DE PROTHÈSE TOTALE DE</b>	
<b>GENOU.....</b>	<b>59</b>
CONSEILS.....	59
EXERCICES RESPIRATOIRES.....	59
EXERCICES CIRCULATOIRES.....	59
EXERCICES DE MOBILITÉ ET RENFORCEMENT.....	60
EXERCICES FAITS AU LIT.....	60
EXERCICES FAITS ASSIS SUR UNE CHAISE.....	62
EXERCICES FAITS EN POSITION DEBOUT.....	63

GLACE OU CHALEUR .....	64
Y A-T-IL DES PRÉCAUTIONS ET DES CONTRE-INDICATIONS CONCERNANT LA GLACE ET LA CHALEUR? .....	64
SERVIETTE DE GLACE .....	64
CHALEUR .....	64
MASSAGE DE LA CICATRICE .....	65
<b>ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE À L'HÔPITAL ET LORS DU RETOUR À DOMICILE</b>	<b>66</b>
POSITIONS AU LIT .....	66
POUR VOUS LEVER DU LIT .....	66
POUR VOUS COUCHER .....	67
POUR VOUS ASSEoir .....	67
POUR VOUS RELEVER.....	67
EN POSITION ASSISE.....	67
POUR LES TOILETTES .....	67
LA MARCHÉ .....	68
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA MARCHETTE OU DE LA CANNE OU DES BÉQUILLES ____	68
COMMENT MARCHER AVEC VOTRE MARCHETTE .....	68
COMMENT MARCHER AVEC VOS BÉQUILLES OU VOTRE CANNE.....	69
AVEC BÉQUILLES.....	69
AVEC CANNE .....	69
LES ESCALIERS .....	70
COMMENT MONTER UN ESCALIER?.....	70
COMMENT DESCENDRE UN ESCALIER? .....	70
TRANSFERT AU BAIN .....	71
TRANSFERT À LA CABINE DE DOUCHE .....	71
HYGIÈNE.....	71
HABILLAGE.....	71
LES BAS.....	72
LES CHAUSSURES.....	72
LES PANTALONS ET LES SOUS-VÊTEMENTS .....	72
<b>ACTIVITÉS DE LA VIE DOMESTIQUE LORS DU RETOUR À DOMICILE .....</b>	<b>72</b>
TÂCHES MÉNAGÈRES .....	72
TRANSPORT DE CHARGES .....	72
ATTEINDRE UN OBJET HORS DE PORTÉE .....	73
LA SEXUALITÉ.....	73
CONDUITE AUTOMOBILE.....	74
<b>LISTE D'ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS .....</b>	<b>75</b>
<b>PRÉVENTION DES CHUTES.....</b>	<b>76</b>
<b>MÉTHODE DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES.....</b>	<b>77</b>
<b>RESSOURCES.....</b>	<b>77</b>
<b>LA CONVALESCENCE APRÈS UNE CHIRURGIE OU UNE HOSPITALISATION .....</b>	<b>77</b>
<b>LISTE DES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS .....</b>	<b>78</b>
<b>FOURNISSEURS / RESSOURCES.....</b>	<b>79</b>
<b>VOTRE CARNET DE NOTES .....</b>	<b>81</b>
<b>VOS INTERVENANTS.....</b>	<b>82</b>

## PASSEPORT ET DIRECTIVES GÉNÉRALES

### CONSIGNES POUR LA VISITE EN PRÉ-ADMISSION

Lorsque l'agente administrative vous contactera pour vous aviser des rendez-vous, utilisez ce formulaire pour inscrire les informations et apportez-le avec vous lors de vos visites à l'Hôpital.

• Date de la chirurgie : \_\_\_\_\_

• Dates et heures des rendez-vous en pré-admission :

---

---

• Autres consignes, s'il y a lieu :

---

À votre arrivée, présentez-vous au rez-de-chaussée,  
en chirurgie d'un jour du Centre de rendez-vous  
pour recueillir votre feuille de route.

• Autres rendez-vous s'il y a lieu:

---

---

---

---

- Alertez le personnel du service de planification avant la chirurgie si vous :
  - Avez un rhume ou une autre maladie.
  - Avez commencé à prendre un nouveau médicament depuis votre dernière visite.
  - Pensez être enceinte.
  - Notez une détérioration de votre santé ou une exacerbation de toute maladie chronique. Exemple : infection des voies respiratoires, grippe avec prise d'antibiotique, angine cardiaque instable, taux de glycémie capillaire non contrôlé, etc. **Votre chirurgie pourrait être retardée.**
- Il est de votre responsabilité de déclarer toute situation qui pourrait porter préjudice à votre chirurgie.
- De plus, si pour toutes autres raisons non médicales, vous ne pouvez vous présenter à la date déterminée, veuillez nous aviser **DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS au 450-359-5000 poste 2085.**

## CONSIGNES POUR VOTRE OPÉRATION

**IMPORTANT : Bien observer les informations sur ce document; sinon, cela peut entraîner l'annulation de votre chirurgie**

- Arrêt** des médicaments : \_\_\_\_\_ jours AVANT l'opération.  
\_\_\_\_\_ jours AVANT l'opération.

### LA VEILLE DE L'OPÉRATION

- Bain ou douche complète, en insistant au niveau de la zone opératoire, avec la solution de chlorhexidine (en vente à votre pharmacie).  
\* *Ne pas mettre de crème, de déodorant, de poudre ou de parfum sur la peau (enlève l'effet de la solution de chlorhexidine).*
- Retirer vos faux ongles, s'il y a lieu.
- Autre : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### LE MATIN MÊME DE L'OPÉRATION

DATE : \_\_\_\_\_

- À jeun à partir de minuit : ne pas boire d'eau, ni manger, ni fumer, ni mâcher de gomme. Vous pouvez toutefois boire de l'eau, du jus de fruit sans pulpe ou du Gatorade jusqu'à 2 heures avant votre arrivée à l'hôpital.
- Ne pas consommer de drogue 48 heures avant l'opération.
- Prenez seulement les médicaments mentionnés par l'infirmière ou le médecin, avec une petite gorgée d'eau : \_\_\_\_\_
- Répétez bain ou douche complète une seconde fois avec la solution de chlorhexidine à domicile.

\* **ENLEVEZ** tous les **BIJOUX, PERCING, MAQUILLAGE** et **VERNIS À ONGLE**.

- Brossez vos dents ou prothèses dentaires.
- Apportez un sac pour y déposer vos vêtements personnels et cadenas si vous voulez utiliser les casiers.

**\*\*\*Apportez le moins de choses possible\*\*\***

- Vous serez hospitalisé, votre valise **DEVRA** demeurer dans la voiture en attendant la disponibilité de votre chambre. Apportez vos produits de soins d'hygiène personnelle car ils ne sont pas fournis par l'Hôpital (voir liste d'effet personnel détaillée à la page 27).
- Vous devez **OBLIGATOIREMENT** avoir un accompagnateur avec vous. Sans accompagnateur, votre chirurgie pourrait être remise.
- Si vous avez des dentiers, lunettes ou verres de contact, apportez vos contenants et étuis personnels identifiés à votre nom.
- Carte de l'Hôpital et carte d'assurance maladie valide **OBLIGATOIRES**.
- Vous recevrez un appel 48 heures avant votre chirurgie. Arrivez à l'Hôpital à l'heure indiquée.

## À VOTRE ARRIVÉE À L'HÔPITAL

HEURE :

1. Présentez-vous avec votre accompagnateur à l'« Admission », située à l'Urgence sur la rue Mc Millan, pour signature, remise d'un dossier et installation d'un bracelet d'Hôpital.
2. Montez ensuite au 3<sup>e</sup> Ouest en chirurgie d'un jour (CDJ) avec votre dossier qui vous a été remis.
3. Ensuite, l'infirmière en chirurgie d'un jour (CDJ) s'occupera de vous!

**S'il y a eu un changement dans votre médication ou dans votre état de santé depuis votre rencontre avec l'infirmière, apportez votre nouvelle liste de médicaments (8 ½ x 11) ou précisez le changement.**

## CONSIGNES POUR VOTRE SUIVI À DOMICILE

### CONGÉ DE L'HÔPITAL :

Prévoir 2 à 4 jours d'hospitalisation.

Heure de départ : \_\_\_\_\_

### CLSC :

Une infirmière du soutien à domicile communiquera avec vous 24 - 48 heures après votre congé de l'Hôpital.

### RENDEZ-VOUS EN CLINIQUE EXTERNE DE PHYSIOTHÉRAPIE :

Date : \_\_\_\_\_

Heure du rendez-vous : \_\_\_\_\_

Où se présenter : \_\_\_\_\_

### RENDEZ-VOUS DE SUIVI AVEC L'ORTHOPÉDISTE DE LA CLINIQUE D'ORTHOPÉDIE À L'HÔPITAL :

Date : \_\_\_\_\_

Heure du rendez-vous : \_\_\_\_\_

Où se présenter : au rez-de-chaussée, au poste 60 à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Faire enlever les agrafes le : \_\_\_\_\_

## INTRODUCTION

Tel que discuté à la clinique d'orthopédie, votre orthopédiste va vous opérer pour le remplacement de votre genou par une prothèse. Le présent guide est un outil d'information et d'enseignement visant à vous préparer adéquatement à votre chirurgie.

### **Votre implication est la clé de votre réussite.**

Plusieurs intervenants (infirmières, intervenants en réadaptation, service social et médecins) vont vous aider dans votre réadaptation et dans la reprise de vos activités quotidiennes. Votre récupération dépendra de votre état de santé, de votre motivation, de **vos efforts personnels** et de votre capacité à reprendre vos activités habituelles. Vous devrez demander à quelqu'un de vous aider et de vous accompagner; cette personne sera **votre motivateur personnel, votre accompagnateur**.

Les conseils qui vous sont transmis dans le document suivant le sont à titre de référence seulement. Les professionnels impliqués dans votre dossier vous donneront un enseignement personnalisé en temps opportun. Ne vous inquiétez pas si l'on vous pose souvent la même question lors de vos visites à l'Hôpital; c'est un processus normal, car chacun des intervenants doit se faire une idée exacte de votre condition de santé afin de vous proposer un plan de soins optimal et approprié à vous.

Dans ce document, un carré  précède les « choses à faire ou à ne pas faire » avant et après votre chirurgie. N'hésitez pas à revoir régulièrement la liste des choses à faire.

Vous devez lire régulièrement ce document, avant, pendant et après votre hospitalisation. Vous devez aussi apporter ce document avec vous lors de chaque visite avec l'équipe soignante.

## VOTRE RÔLE

Au-delà de l'expertise de votre chirurgien orthopédiste, **c'est vous qui jouez le rôle le plus important** dans votre chirurgie et dans votre rétablissement. Vous souhaitez le meilleur résultat possible de l'opération, vous devez donc vous y préparer<sup>1</sup>.

Vous préparer mentalement et physiquement à une chirurgie orthopédique est une étape importante pour assurer le succès de l'opération. Poser des questions et vous informer sur le déroulement de l'opération, votre séjour à l'Hôpital et votre retour à la maison sont des moyens pour dissiper vos craintes et augmenter votre participation à votre retour à la maison.

Votre implication dans la préparation à la chirurgie sera un facteur très important pour votre réadaptation postopératoire. La première étape de votre préparation sera d'identifier une personne de votre entourage qui pourra vous accompagner à vos différents rendez-vous et vous aider dans tout le continuum de votre chirurgie, depuis votre préparation préopératoire à votre convalescence.

---

<sup>1</sup> La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)



Vous devez être conscient que vos besoins suite à une chirurgie seront différents de vos besoins avant la chirurgie, mais le tout est **temporaire**. Nous vous guiderons à toutes les étapes de cette aventure, mais vous devez être au cœur du processus et vous assurer de participer au maximum ainsi que de comprendre ce que nous attendons de vous.

Si vous prévoyez que personne ne pourra être disponible pour vous assister à votre retour, il pourrait être nécessaire d'habiter chez une personne de votre entourage qui pourra vous recevoir à votre sortie de l'Hôpital pour la période de convalescence jusqu'à votre retour possible à la maison. Si nécessaire, faites des arrangements avec une maison de convalescence privée que vous aurez visitée et réservez votre place avant votre chirurgie.

## **LE RÔLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR**

Cette personne de confiance vous accompagnera tout au long du processus, depuis les séances d'information jusqu'à votre retour à la maison et lors de vos visites en physiothérapie. Elle vous encouragera dans vos activités quotidiennes et dans vos exercices. Elle sera votre mémoire, votre entraîneur, votre motivateur et votre soutien. Elle pourrait rester avec vous à votre retour à domicile, et ce, pour plusieurs jours. Sa présence pourra être continuelle au début, puis diminuer graduellement selon votre condition et vos besoins. Elle pourrait ainsi faire les courses (banque, épicerie...), préparer des repas, aider aux tâches ménagères... **Elle est donc votre guide, mais elle ne fera pas ce que vous serez capable de faire.**

Si votre langue maternelle n'est pas le français, il est d'autant plus important de vous faire accompagner par une personne en qui vous avez confiance. Cette personne pourra communiquer en votre nom avec l'équipe soignante.

Nous vous suggérons de vous faire accompagner par **une seule personne**, idéalement votre **accompagnateur** ou, occasionnellement, son remplaçant. Ainsi, vous serez plus concentré pour recevoir toutes les informations que nous vous donnerons tout au long du processus et cette personne recevra la même information que vous. Vous pourrez donc la consulter au besoin.

## **COMPRENDRE SA PATHOLOGIE ET LA CHIRURGIE PROPOSÉE**

L'arthroplastie du genou est une chirurgie qui consiste à remplacer les surfaces articulaires douloureuses et endommagées de votre genou par des parties artificielles métalliques et plastiques. De manière générale, l'arthroplastie est pratiquée lorsque les traitements conventionnels (médicaments et exercices) échouent à soulager la douleur et à améliorer la fonction articulaire.

La prothèse de genou répond à quatre objectifs :

1. supprimer ou diminuer la douleur quand les autres traitements ne sont plus efficaces,
2. améliorer la mobilité articulaire,
3. améliorer la fonction,
4. assurer la stabilité de l'articulation ou corriger une déformation.



Genou sain <sup>2</sup>

Genou arthrosique

Genou avec prothèse de genou

L'articulation du genou est constituée de trois surfaces articulaires : fémorale, tibiale et patellaire (rotule). Les surfaces fémorales et tibiales sont le plus souvent celles qui sont problématiques car elles supportent le poids de votre corps. Toutefois, selon votre problème, l'orthopédiste pourrait aussi resurfer la composante patellaire (la rotule). Le fémur est l'os de la cuisse qui descend jusqu'au genou pour s'articuler avec le tibia qui monte de la cheville.

Généralement, après votre convalescence, vous marcherez mieux qu'avant et vous aurez moins de douleur. Les mouvements et la force obtenus après votre réadaptation vous permettront de reprendre progressivement les activités que vous aimez en évitant de faire subir trop d'impacts ou de torsion à votre nouveau genou. Il faut respecter la séquence de reprise des activités (voir p.51) et il faut suivre les recommandations médicales.

**Le résultat d'une prothèse de genou dépendra de la qualité de la musculature et des os, ainsi que de la mobilité articulaire préexistante.** Ces éléments sont très variables selon le problème, l'âge et la fonction avant la chirurgie.

## DURÉE DE SÉJOUR


La planification de votre chirurgie débute dès votre visite en orthopédie.

À toutes les étapes de votre cheminement (accueil, rencontre de groupe, pré-admission et lors de votre hospitalisation), nous nous assurerons que les plans pour votre congé soient maintenus.

Votre durée de séjour dépendra de votre santé et de votre récupération. Pour la majorité des gens ayant subi une chirurgie comme la vôtre, **la durée de séjour est de 2 à 4 jours. Ainsi, si vous êtes opéré un lundi, vous pourriez retourner à domicile le jeudi matin ou avant.** Si votre condition de santé requiert des soins complémentaires, l'équipe soignante y verra.

<sup>2</sup> Site de Orthogate: <http://www.eorthopod.com/eorthopodV2/index.php/ID/bc6117f6c5f98a17135e5aac6c0cf6d7>

## VOTRE CHEMINEMENT



Voici le continuum proposé pour toutes les phases du plan de soins :

PHASES	ACTEURS	OBJECTIFS
<b>①</b> <b>PRÉHOSPITALIÈRE</b>	<b>Vous-même et votre accompagnateur</b>	Optimiser votre santé et votre forme physique. Préparer votre domicile et votre retour à domicile. Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations.
	<b>La rencontre de groupe</b>	Vous donner toutes les informations nécessaires à votre préparation et à votre retour sécuritaire à domicile; débiter un enseignement structuré pour optimiser votre santé. Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations.
	<b>L'accueil</b>	Planifier la date de votre pré-admission et de votre chirurgie.
	<b>La pré-admission</b>	Évaluer votre état de santé et vos particularités fonctionnelles (par divers membres de l'équipe soignante et médicale). Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations ainsi que la planification de votre sortie de l'Hôpital.
<b>②</b> <b>HOSPITALIÈRE</b> Durée de séjour : 2 à 4 jours	<b>Vous-même et votre accompagnateur</b>	Collaborer avec l'équipe soignante. Faire tous les exercices demandés. Communiquer constamment avec l'équipe soignante et médicale.
	<b>Chirurgie d'un jour (CDJ)</b> <b>Salle d'opération –</b> <b>Salle de réveil</b>	Vous accueillir et vous préparer le matin de votre chirurgie. Procéder à la chirurgie. Assurer la surveillance post-chirurgicale immédiate.
	<b>Unité de soins</b>	Vous accueillir quand votre condition médicale est stabilisée. Vous donner les soins et le soutien postopératoires en lien avec l'équipe de réadaptation, tels que : réduire au maximum votre douleur, encourager votre mobilisation, soigner votre plaie. Prévenir et dépister les complications. Préparer votre retour à domicile.
<b>③</b> <b>POSTHOSPITALIÈRE</b>	<b>Vous-même et votre accompagnateur</b>	Faire tous les soins et exercices demandés. Favoriser une récupération optimale de votre fonction. Assurer la prévention et la surveillance des complications. Communiquer au besoin avec l'équipe soignante et médicale (infirmière, physio, etc.).
	<b>CLSC/Soutien à domicile</b>	Assurer le soutien et le suivi de votre condition physique.
	<b>Physiothérapie externe</b>	Poursuivre votre réadaptation.
	<b>Orthopédiste</b>	Assurer le suivi de votre chirurgie.
<b>④</b> <b>VIVRE AVEC SA PROTHÈSE</b>	<b>Orthopédiste</b>	Assurer la surveillance de votre condition en lien avec votre prothèse.
	<b>Vous-même et votre accompagnateur</b>	Suivre les conseils reçus. Poursuivre le programme d'exercices et l'adoption de saines habitudes de vie.

VOTRE RÉADAPTATION

# 1- PHASE PRÉHOSPITALIÈRE

## VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR

Les activités qui vous sont proposées à cette phase ont 3 objectifs principaux :

1. Optimisation de votre santé et de votre forme physique.
2. Préparation de votre domicile et de votre retour à domicile.
3. Clarification de vos questionnements, peurs et préoccupations.

### 1. Optimisation de votre santé et de votre forme physique

L'adoption de saines habitudes de vie est primordiale pour optimiser votre santé et votre forme physique avant votre chirurgie. Ainsi, les mesures que nous vous proposons (voir le tableau synthèse à la page 17) aident à réduire les risques de complications postopératoires. En voici quelques éléments :

#### Alimentation

- Conservez ou atteignez votre poids santé. Cela facilitera vos exercices et protégera vos articulations, il sera ainsi plus facile de vous mobiliser et de reprendre vos activités de la vie quotidienne.
- Une saine alimentation favorise un rétablissement plus rapide après une chirurgie et aide à prévenir les complications postopératoires. Prenez trois repas équilibrés par jour en vous référant au *Guide alimentaire canadien* (GAC : [www.hc-sc.gc.ca](http://www.hc-sc.gc.ca)) ou en consultant une nutritionniste. Vous pouvez aussi ajouter des collations, au besoin. Les quatre groupes du GAC sont les viandes et substituts, le lait et les substituts, les produits céréaliers et les légumes et les fruits. Il est important, avant et après votre chirurgie, de porter une attention particulière à certains nutriments : protéines, fer, calcium, vitamine D et fibres alimentaires.
- Le calcium et la vitamine D sont des nutriments importants pour maintenir votre ossature solide et en santé. Les adultes de plus de 50 ans doivent consommer quotidiennement 2 à 3 portions de lait ou de produits enrichis de calcium. De plus, un supplément de vitamine D de 400 UI est recommandé pour toute personne de 50 ans et plus<sup>3</sup>.
- Buvez beaucoup d'eau, particulièrement les jours précédant votre chirurgie, pour que votre hydratation soit optimale au moment de votre chirurgie (1,5 à 2 litres par jour), sauf si vous avez une restriction liquidienne.
- La consommation d'alcool peut avoir un impact sur votre séjour à l'Hôpital. Il est important de comprendre que l'alcool :
  - i. diminue la capacité de votre système immunitaire;
  - ii. nuit à la guérison des tissus (mauvaise cicatrisation...);
  - iii. favorise certaines complications comme le delirium, la pneumonie, les infections, etc.;
  - iv. rend la gestion de la douleur plus difficile.

---

<sup>3</sup> [www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/vitamin/vita-d-fra.php](http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/vitamin/vita-d-fra.php)

Nous vous recommandons donc de réduire au minimum votre consommation d'alcool quelques semaines avant la chirurgie. L'alcool, l'anesthésie et les analgésiques ne font pas toujours bon ménage. Des réactions telles que confusion, hallucinations, tremblements, nausée et vomissements pourraient survenir.

#### Activités physiques <sup>4</sup>

Faire de l'exercice avant la chirurgie peut vous aider à améliorer votre endurance, votre force musculaire, votre posture, votre équilibre, votre circulation sanguine et votre santé cardiaque. Ainsi, cela pourrait vous permettre de récupérer plus rapidement après l'opération.

Votre réadaptation commence donc avant votre chirurgie. Voici ce que nous vous suggérons de faire dès maintenant :

- Pratiquez quotidiennement les exercices de mobilité, de renforcement et d'équilibre ([voir feuilles à bordures bleues](#) à la page 59).
- Exercez-vous à utiliser une aide à la marche. De plus, l'utilisation d'une aide à la marche pourrait vous être conseillé dès maintenant afin de diminuer vos douleurs (voir ajustement canne, béquilles et marchette, p. 68).
- Restez actif ou devenez-le en respectant vos limites et en variant vos activités. Si vous n'êtes habituellement pas actif, vérifiez avec votre médecin de famille le niveau d'activité qui est sécuritaire pour vous. Voici quelques conseils :
  - Nous vous suggérons la marche, la natation, la bicyclette stationnaire, etc. (en respectant votre douleur). Évitez le jogging, les sauts et les accroupissements.
  - Il est important de débiter lentement. Commencez par quelques minutes par jour et augmentez graduellement jusqu'à 20 à 30 minutes par jour. Portez des chaussures qui absorbent les chocs et supportent l'arche plantaire.
  - Pour demeurer à un niveau d'entraînement sécuritaire, assurez-vous de pouvoir continuer à parler pendant que vous faites l'activité, sans être à bout de souffle.
  - Une douleur articulaire ou musculaire qui dure plus de 2 heures après les exercices ou une fatigue jusqu'au lendemain indique que vous en avez probablement trop fait ou trop vite!

#### Gestion du stress, pensée positive et sommeil réparateur <sup>5</sup>

Le stress a des impacts négatifs sur votre santé, votre système immunitaire, votre système cardiorespiratoire et sur votre état d'esprit en général. Il est donc crucial de détendre votre corps et de calmer votre esprit. Les bienfaits d'une pensée positive vous permettront d'être plus en contrôle de vos émotions, de ralentir votre respiration, de réduire votre tension musculaire et de diminuer votre anxiété. Votre attitude est importante : les optimistes ont tendance à

---

<sup>4</sup> La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

<sup>5</sup> Mieux vivre avec une MPOC, Un outil d'éducation aux patients. [www.livingwellwithcopd.com](http://www.livingwellwithcopd.com)

chercher des solutions à leurs problèmes, tandis que les pessimistes ont tendance à ressasser ou ruminer leurs inquiétudes et leurs peurs.

- Nous vous recommandons donc d'être prêt plusieurs jours avant la chirurgie afin de dormir le mieux possible pour arriver reposé à votre chirurgie.
- Pratiquez régulièrement la méthode de relaxation suivante. Prévoyez donc une séance de relaxation quotidienne d'une quinzaine de minutes, idéalement, après vos exercices.

#### **Technique de relaxation**

1. Placez une main sur votre abdomen.
2. Inspirez profondément en vous concentrant sur une image positive. Utilisez tous vos sens (c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) pour rendre votre image encore plus réelle. Par exemple, imaginez que vous êtes en croisière, le ciel est bleu, les eaux sont scintillantes et le paysage est splendide, vous entendez le bruit de la mer et sentez l'air frais.
3. Sentez votre abdomen se gonfler. Faites sortir votre abdomen le plus possible pendant que vous inspirez; cela vous aidera à bien remplir vos poumons d'air.
4. Expirez par la bouche tout en gardant les lèvres pincées (comme si vous vouliez éteindre une chandelle).
5. Sentez votre abdomen revenir à son niveau de gonflement normal. Commencez à vous détendre.
6. Après chaque expiration, attendez d'être prêt avant de prendre la prochaine inspiration. Continuez cet exercice de relaxation en visualisant votre image positive.
7. Après quelques respirations, vous adopterez votre propre rythme. Par exemple : une respiration profonde pour chaque série de 5 respirations normales. Si vous commencez à vous sentir étourdi, prenez quelques respirations normales avant de recommencer. Terminez cet exercice de relaxation et de visualisation en retenant votre image.

**Ressentez-vous le calme qui vous habite? Goûtez ce calme et cette paix. Prenez quelques minutes pour jouir de cet intense état de relaxation.**

#### **Le tabac et votre santé**

Le tabagisme retarde la guérison osseuse et la cicatrisation des plaies. C'est aussi un facteur favorisant les complications pulmonaires et un facteur prédisposant à l'arthrose. N'oubliez pas que la fumée secondaire est aussi dommageable pour une personne qui ne fume pas. Plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider à cesser de fumer : votre pharmacien, votre médecin de famille, les centres d'abandon tabagique, certains sites tels que : [www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/index-fra.php](http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/index-fra.php) (Santé Canada), [www.pq.poumon.ca](http://www.pq.poumon.ca), [www.defitabac.qc.ca](http://www.defitabac.qc.ca), [www.jarrete.qc.ca](http://www.jarrete.qc.ca), [www.cqts.qc.ca](http://www.cqts.qc.ca), [www.cancer.ca](http://www.cancer.ca) ou la Ligne Poumons 9, au 1-888-768-6669 poste 232.

- Nous vous recommandons<sup>6</sup> de cesser de fumer au moins 1 mois avant toute chirurgie.

### La santé buccale <sup>7</sup>

Les orthopédistes recommandent de soigner les problèmes dentaires ou gingivaux avant une arthroplastie. Il est également important de compléter toute intervention dentaire, car des germes de votre bouche pourraient s'introduire dans votre circulation sanguine et infecter votre nouvelle articulation.

- Vérifiez auprès de votre dentiste s'il y a un problème quelconque qui mérite une attention particulière avant votre chirurgie orthopédique.

### Optimisation du contrôle de vos maladies chroniques

- Consultez votre médecin de famille pour optimiser le contrôle de vos maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires ou les maladies cardiaques.
- Afin de prévenir les complications circulatoires, nous vous suggérons<sup>8</sup> d'éviter de rester assis plus de 3 heures consécutives durant le mois précédent et le mois suivant votre chirurgie. Les longs voyages sont donc déconseillés.

### Vaccination

Le Protocole d'immunisation du Québec<sup>9</sup> indique que « les personnes souffrant de maladies chroniques ne sont pas plus exposées aux maladies évitables par la vaccination, mais risquent, si elles les contractent, de présenter une morbidité (*des complications*) et une mortalité plus élevées. Les vaccinations contre l'influenza, le pneumocoque, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos sont recommandées ».

- Nous vous suggérons donc de discuter avec votre médecin de famille de la mise à jour de votre profil de vaccination ou de participer aux campagnes de vaccination organisées par le ministère de la Santé.

---

<sup>6</sup> Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals, Deverick J. Anderson et al., S51 infection control and hospital epidemiology October 2008, vol. 29, supplement 1

<sup>7</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. <http://www.canorth.org/fr/Default.aspx>

<sup>8</sup> [http://guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc\\_id=10786&string=](http://guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=10786&string=)

<sup>9</sup> Protocole d'immunisation du Québec, 2009, ISBN : 978-2-550-55612-1 (version PDF) se consulte à l'adresse <http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/09-283-02.pdf>



## TABLEAU SYNTHÈSE DE L'OPTIMISATION DE VOTRE SANTÉ

Moyens d'optimiser votre santé	Prévention ou réduction des complications possibles
<b>Saine alimentation selon le <i>Guide alimentaire canadien</i>, combinée avec une bonne hydratation. Votre médecin de famille pourrait vous prescrire des suppléments de fer et (ou) des vitamines : vérifiez avec lui.</b>	Favorise une meilleure récupération postopératoire. Prévient l'anémie. Favorise une meilleure guérison de la plaie. Aide à prévenir les plaies de lit. Aide à améliorer la forme physique. Diminue la fatigue. Permet un meilleur contrôle de la glycémie.
<b>Atteinte du poids santé</b>	Facilite les exercices postopératoires. Facilite la mobilisation. Permet une reprise plus rapide des activités de la vie quotidienne. Optimise la durée de vie de votre prothèse. Aide à prévenir la phlébite. Aide à prévenir les infections.
<b>Réduction de la consommation d'alcool</b>	Renforce le système immunitaire. Réduit le risque de delirium, hallucination, pneumonie, infection. Aide à mieux contrôler la douleur postopératoire. Favorise une meilleure cicatrisation.
<b>Activités physiques</b>	Augmente l'endurance. Augmente la force musculaire. Facilite la mobilisation après la chirurgie. Réduit le risque de phlébite. Réduit le risque de chute.
<b>Gestion du stress et du repos</b>	Optimise votre capacité à vous détendre. Améliore le sommeil avant et après la chirurgie. Aide à mieux contrôler la douleur.
<b>Cessation tabagique</b>	Favorise une meilleure guérison osseuse. Offre les conditions d'une meilleure cicatrisation. Optimise la capacité pulmonaire. Réduit les risques d'infection.
<b>Santé buccale</b>	Réduit les risques d'infection.
<b>Contrôle des maladies chroniques : diabète, hypertension, maladies cardiaques, maladies circulatoires</b>	Favorise une meilleure cicatrisation. Offre les conditions d'une meilleure cicatrisation. Facilite la mobilisation après la chirurgie. Réduit les risques d'infarctus postopératoire. Réduit les risques de phlébite / œdème respiratoire.
<b>Prise régulière des analgésiques</b>	Optimise le contrôle de la douleur pour favoriser une récupération rapide. Améliore l'efficacité du médicament. Aide à maintenir le niveau de douleur à 3/10 ou moins dès le jour 2 postopératoire.

## 2. Préparation de votre domicile et de votre retour à domicile

Vous serez moins mobile après votre chirurgie. Il sera donc important de planifier les points de la liste suivante **avant** votre arrivée à l'Hôpital.

### Liste de vérification : À faire pour la préparation de votre domicile

- Assurez-vous que votre accompagnateur (parent ou un membre de votre entourage) vous offrira un minimum d'aide lors de votre retour à la maison.
- Étant donné que vous ne pourrez pas conduire pendant 6 à 8 semaines, prenez des dispositions en vue de votre transport à la maison après votre séjour à l'Hôpital et pour vos rendez-vous (certains organismes communautaires offrent ce service (voir dans la liste des ressources page 79).
- Si vous recevez actuellement ou avez reçu dans les 3 derniers mois des services du CLSC, vous devez les aviser de la date de votre chirurgie.
- Trouvez une épicerie qui offre un service de livraison et (ou) de commande par Internet ou quelqu'un qui le fera pour vous.
- Trouvez une pharmacie qui offre un service de livraison.
- Achetez ou préparez à l'avance des repas que vous mettrez à congeler et que vous pourrez réchauffer au four à micro-ondes.
- Prévoyez l'entretien de votre résidence pendant votre convalescence, de la tonte du gazon l'été à l'enlèvement de la neige l'hiver.
- Trouvez quelqu'un pour garder ou soigner vos animaux domestiques.
- Lisez et appliquez les conseils de la section Prévention des chutes (à la page 76).
- Toutefois, si vous n'avez personne pour vous aider ou prendre soin de vous, vous devrez trouver une maison de convalescence privée qui pourra vous accueillir (voir dans les pages jaunes la rubrique « Résidences pour personnes retraitées »). Faites vos arrangements à l'avance. Si vous désirez néanmoins retourner chez vous, contactez des organismes qui offrent des services à domicile (voir dans les pages jaunes la rubrique « Services sociaux et humanitaires »).
- Procurez-vous les équipements suggérés par l'équipe soignante lors de votre visite en pré-admission (voir liste d'équipements page 75). Assurez-vous de les avoir à domicile avant votre entrée à l'Hôpital. Avez-vous une assurance privée qui couvre ce genre d'équipement? Pour les dossiers de CSST et de SAAQ : demandez une ordonnance à votre chirurgien que vous pourrez fournir à l'agent attitré à votre dossier.

#### Aménagez votre domicile :

- Enlevez tapis (carpettes), obstacles et fils électriques et disposez vos meubles de façon à ce que vous puissiez circuler facilement (peut-être avec une marchette).

- Aménagez les pièces de façon à éviter les escaliers comme, par exemple, en organisant une chambre au rez-de-chaussée. Si vous devez tout de même utiliser les escaliers, faites installer, au besoin, des mains courantes.
- Prévoyez un lit ferme, assez haut (plus haut que le pli arrière du genou) pour faciliter vos transferts (un lit trop bas exigera beaucoup plus d'efforts pour vous relever). Au besoin, surélevez votre lit avec des blocs de bois ou ajoutez un autre matelas.
- Placez tous les objets que vous utilisez régulièrement à une hauteur facilement accessible sans vous pencher ou monter sur un tabouret (chambre à coucher, cuisine, salle de bain, garde-robe, salle de lavage...).
- Prévoyez un éclairage adéquat pour la nuit dans votre chambre, les couloirs et la salle de bain, et organisez un espace pour garder près du lit ce dont vous avez besoin la nuit.
- Prévoyez un fauteuil haut (assise plus haute que le pli arrière du genou), pourvu d'appuis-bras, dans chacune des pièces que vous utiliserez après votre chirurgie.

#### **Aménagez, au besoin, la salle de bain :**

- Installez un siège de toilette surélevé avec des appuis-bras intégrés ou avec un cadre de sécurité pour la toilette, afin de vous aider à vous asseoir et vous relever de la toilette (facultatif).
- Enlevez les portes coulissantes de la baignoire et remplacez-les par un rideau de douche (facultatif).
- Installez un banc de transfert de bain ou une planche de bain dans la baignoire et (ou) un siège de douche dans la cabine de douche (facultatif).
- Installez des tapis antidérapants à l'intérieur et à l'extérieur du bain.
- Installez une douche téléphone dans la baignoire ou dans la douche.
- Posez des barres fixes au mur (facultatif) pour améliorer votre sécurité. N'utilisez jamais les barres de serviettes ou le porte-savon pour vous soutenir.

### **3. Clarification de vos questionnements, peurs et préoccupations**

La préparation à une chirurgie majeure requiert la compréhension de plusieurs éléments. Pour que votre participation soit optimale à toutes les étapes du processus, nous vous encourageons à :

- Préparer chaque rencontre avec les intervenants en écrivant vos questions.
- Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'infirmière lors de la pré-admission.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, lisez ce document le plus tôt possible afin d'apporter tous les changements souhaités à vos habitudes de vie.

QUESTIONS :

---

---

---

## LA RENCONTRE DE GROUPE

Vous avez été invité à assister **le plus tôt possible** à une rencontre d'information et d'enseignement structuré avec les membres de l'équipe de réadaptation et de l'équipe soignante. Il y a 2 objectifs principaux à cette rencontre de groupe :

**1. Vous donner l'information nécessaire à votre préparation et à votre retour sécuritaire à domicile; débiter un enseignement structuré pour optimiser votre santé**

Vous rencontrerez une infirmière, un professionnel de la physiothérapie, un ergothérapeute. Nous aborderons les thèmes suivants :

- La prothèse de genou.
- Le continuum de soins.
- L'optimisation de votre santé : les bonnes habitudes de vie, l'alimentation, la cessation tabagique.
- Comment planifier votre retour à domicile : votre préparation et celle de votre domicile.
- La prévention des complications et le contrôle de la douleur.
- Les autosoins : auto-injection des anticoagulants, autosoins de la plaie chirurgicale.
- Les exercices : mobilité, force, endurance et aérobiques légers à modérés.
- Les transferts, les activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique en lien avec les équipements requis.
- Les aides à la marche : techniques et ajustements.

**2. Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations**

Vous rencontrerez des gens en attente de la même chirurgie que vous. Vous prenez ainsi connaissance de leurs préoccupations et vous pouvez partager vos expériences et vos soucis. Voici les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette rencontre :

**À la fin de la rencontre nous pensons que vous serez en mesure de :**

1. Comprendre la chirurgie proposée.
2. Comprendre votre rôle et celui de votre accompagnateur et connaître vos responsabilités.
3. Expliquer ce qui vous attend: avant, pendant et après votre chirurgie.
4. Connaître les éléments de préparation du domicile.
5. Déterminer les mesures pour optimiser votre santé avant la chirurgie.
6. Comprendre l'importance de la gestion de la douleur.

7. Connaître les soins et les éléments de surveillance de la plaie et des complications postopératoires.
8. Simuler l'auto-injection de l'anticoagulant.
9. Commencer les exercices préopératoires et postopératoires.
10. Utiliser les aides à la marche et déterminer les aides fonctionnelles utiles pour vous.
11. Connaître comment ajuster votre aide technique
12. Savoir comment faire les transferts les plus courants.
13. Prévoir les difficultés que vous pourrez éprouver à votre retour à domicile et trouver des solutions possibles.
14. Être rassuré face à vos questionnements, peurs et préoccupations.

Nous concluons cette rencontre de groupe par l'engagement moral de la page 25, que vous signez pour confirmer votre adhésion au plan de soins proposé.

## L'ACCUEIL DE LA PRÉ-ADMISSION

Quelques semaines avant votre chirurgie, une fois que vous aurez assisté à la rencontre de groupe, vous recevrez un appel téléphonique d'une agente administrative de la pré-admission.

Il y a 2 objectifs principaux à l'appel de la pré-admission :

### 1. Planifier la date de votre pré-admission et de votre chirurgie

L'agente administrative de la pré-admission vous téléphonera quelques semaines avant votre chirurgie pour vous donner la **date prévue de votre chirurgie**, ainsi qu'un rendez-vous **pour votre visite de pré-admission** : inscrivez l'information dans votre passeport, à la page 5. Plusieurs rencontres seront planifiées lors de cette journée ou autre, selon la disponibilité des intervenants. On vous indiquera à quelle heure et l'endroit où vous devez vous présenter.

### 2. Préciser vos besoins lors de votre séjour hospitalier

48 heures avant votre intervention, une autre agente vous contactera afin de **confirmer la date et l'heure de la chirurgie**, votre état de santé et l'heure à laquelle vous devrez vous présenter.

- Nous vous demanderons de nous communiquer les informations concernant votre assurance médicale privée, s'il y a lieu.

## LA VISITE EN PRÉ-ADMISSION

Une fois votre chirurgie planifiée, on vous donnera un rendez-vous pour vous présenter à la pré-admission. Il y a 2 objectifs principaux à cette visite :

1. Évaluer votre état de santé et vos particularités fonctionnelles au cours de rencontres individuelles avec divers membres de l'équipe soignante et médicale (au besoin).
2. Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations ainsi que la planification de votre sortie de l'Hôpital.

Pour vous y préparer, voici ce que vous devez faire :

- Débutez les exercices sélectionnés (page 59).
- Écrivez vos questions, peurs et préoccupations (espace prévu à la fin pour écrire). Apportez (si cela s'applique à vous) :
  - La liste de vos médicaments fournie par votre pharmacie ainsi que la liste des produits naturels (vitamines, herbes, etc.) que vous prenez. **Il est obligatoire d'obtenir chez votre pharmacien votre profil pharmacologique (8 ½ x 11) récent pour le médecin et vous pourriez en conserver une copie dans votre sac à main et/ou portefeuille.**
  - Les rapports médicaux des spécialistes que vous avez consultés dernièrement.
  - Votre carte d'Hôpital et d'assurance maladie valide.
  - Vos lunettes et prothèses auditives.
- Venez avec votre accompagnateur (obligatoire).
- Prévoyez une collation ou de l'argent pour déjeuner et dîner, ainsi que pour le stationnement de même que des vêtements amples et confortables.
- Il est possible que vos rendez-vous soient la même journée ou étalés selon la disponibilité des intervenants à rencontrer.
- Lors de votre pré-admission, vous rencontrerez divers membres de notre équipe soignante afin de planifier avec vous votre plan de soins avant, pendant et après votre chirurgie :
  - Infirmière
  - Technologue en radiologie
  - Travailleur social au besoin.
  - Médecins spécialistes : spécialiste en médecine interne, cardiologue, anesthésiologiste, pneumologue, etc.

**Vous devez apporter ce document avec vous lors de la pré-admission.**

Il vous faudra prévoir une demie journée pour cette visite. Un horaire des différentes rencontres et rendez-vous d'examen vous sera remis dès votre arrivée, au centre de rendez-vous poste 35.

### **1. Rencontre d'évaluation individuelle de votre état de santé et de vos particularités fonctionnelles avec divers membres de l'équipe soignante et médicale**

Dès votre visite en orthopédie nous commençons à faire la collecte de vos données personnelles : antécédents, profil de santé, chirurgies antérieures, médicaments. Lors de votre pré-admission, nous vous donnerons encore certains documents et questionnaires à remplir. Nous y ajouterons les informations relatives à votre niveau fonctionnel, à votre capacité de marcher, à vos douleurs, aux particularités de votre domicile, à vos arrangements pour votre retour à domicile.

Vous aurez également des examens pour faire un bilan de santé préliminaire à votre chirurgie; selon votre profil de santé, ces examens peuvent varier. En général, une prise de sang et un électrocardiogramme sont requis. On vous informera si une préparation particulière est nécessaire (à jeun, etc.).

Il pourrait vous être recommandé certains tests complémentaires ou faire une demande de consultation à un autre spécialiste (cardiologue, pneumologue, urologue...) afin de clarifier certains points. Il pourrait aussi vous être indiqué lesquels de vos médicaments vous devez cesser ou continuer avant votre chirurgie.

Pratiquement toutes les chirurgies nécessitent une certaine forme d'anesthésie<sup>10</sup>. L'anesthésiologiste est chargé de veiller à votre bien-être global, notamment en évaluant votre santé avant la chirurgie et en surveillant de près vos signes vitaux pendant la chirurgie et la période de réveil. Le matin de votre chirurgie, un anesthésiologiste vous expliquera les différentes options d'anesthésie et vous orientera dans le choix de la procédure optimale pour vous, compte tenu de la chirurgie que vous subirez et de votre état de santé. Il vous expliquera également la prise en charge qu'il suggère pour gérer votre douleur après la chirurgie.

Il existe trois types d'anesthésie : régionale, générale ou une combinaison des deux.

- L'anesthésie régionale ou locale engourdit seulement la zone du corps qui doit être opérée. Le reste de votre corps est sensible à ce qui se passe. Le type d'anesthésie régionale le plus courant est l'anesthésie rachidienne ou péridurale (dans le dos). Il existe aussi ce qu'on appelle des blocs nerveux lors desquels l'anesthésiologiste injecte un médicament anesthésiant près d'un ou plusieurs nerfs de votre jambe. Ce médicament permet de réduire la douleur occasionnée par la chirurgie. Cette méthode est expliquée en détails plus loin dans ce document.
- L'anesthésie générale engourdit tout l'organisme, y compris le cerveau, pour que vous ne sentiez rien et que vous soyez inconscient pendant la chirurgie.
- Une combinaison d'anesthésie régionale et une sédation engourdit la zone à opérer tout en vous aidant à vous détendre et à être moins conscient de la chirurgie.

Le type d'anesthésie que vous recevrez dépendra du type de chirurgie et de votre santé globale. Discutez-en avec l'anesthésiologiste.

## **2. Clarifier vos questionnements, peurs et préoccupations ainsi que la planification de votre sortie de l'Hôpital**

Au cours de toutes ces rencontres individuelles avec les différents membres de l'équipe médicale et soignante, vous aurez l'occasion de poser des questions à

---

<sup>10</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

propos de votre chirurgie et de votre rétablissement. Nous vérifierons aussi avec vous si tout est en place pour faciliter votre retour à domicile. Nous en profiterons pour revoir avec votre accompagnateur son implication et ses disponibilités. Nous concluons cette visite par la révision de l'engagement moral que vous aurez signé lors de la rencontre de groupe (voir page 25).



## ENGAGEMENT MORAL <sup>11</sup>

Nous pensons qu'un patient qui participe activement à son traitement en tire le maximum de profit. Notre objectif est de faire en sorte que le continuum de vos soins se fasse de la meilleure façon possible, en planifiant au mieux chacune des étapes et en vous impliquant tout au long du processus. En gardant ceci en tête, nous vous encourageons à lire les énoncés suivants et à accepter de vous impliquer au meilleur de vos capacités.

### *Je comprends et j'accepte qu'avant ma chirurgie :*

- Je prendrai les arrangements nécessaires et préparerai mon domicile pour un retour à domicile sécuritaire : je trouverai quelqu'un ou un organisme communautaire qui prendra soin de moi à mon retour.
- J'essaierai d'améliorer ma tolérance aux exercices et d'optimiser ma santé.
- Je lirai le matériel éducatif reçu.
- Je pratiquerai les exercices et transferts enseignés.
- Je me procurerai les équipements suggérés.
- J'organiserai le transport pour ma sortie de l'Hôpital.
- J'organiserai le transport pour mes visites en physiothérapie en externe.
- Je respecterai les consignes préopératoires : quelques jours avant la chirurgie, la veille et le matin.

### *Je comprends et j'accepte que pendant mon hospitalisation :*

- Je suivrai les directives de l'équipe soignante.
- J'essaierai d'augmenter mon niveau fonctionnel le plus rapidement possible en prenant une part active à mon programme de soins : exercices, transferts, marche, etc. et je prendrai part active à ma réadaptation.
- Je discuterai de toutes mes questions avec le personnel de soins concerné.

### *Je comprends et j'accepte qu'après mon hospitalisation :*

- Je suivrai les traitements suggérés, dans les délais prescrits et j'irai à tous les rendez-vous requis pour le suivi de la chirurgie.
- Je prendrai une part active à ma réadaptation en faisant les exercices prescrits à domicile et lors de mes séances de physiothérapie.
- Les services externes de réadaptation me seront offerts jusqu'à ce que ma condition soit jugée fonctionnelle. La suite de ma réadaptation deviendra ensuite ma responsabilité propre (clinique privée de physiothérapie, centre de conditionnement, etc.).

Signature du patient : \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_

Signature de l'accompagnateur : \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_

Professionnel témoin : \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> Basé sur le document : [A guide for patients having hip or knee replacement](#). Holland orthopaedic & Arthritic Center, Sunnybrook, Toronto.

## 2 - PHASE HOSPITALIÈRE

PHASE	ACTEURS	ACTIVITÉS
② HOSPITALIÈRE Durée de séjour : 2 à 4 jours	Vous-même et accompagnateur	Collaborer avec l'équipe soignante. Faire tous les exercices demandés. Communiquer constamment avec l'équipe soignante et médicale.
	Chirurgie d'un jour (CDJ)	Vous accueillir et vous préparer le matin de votre chirurgie.
	Salle d'opération - Salle de réveil	Procéder à la chirurgie. Assurer la surveillance post-chirurgicale immédiate.
	Unité de soins en d'orthopédie (6 <sup>e</sup> Nord)	Vous accueillir quand votre condition médicale est stabilisée. Vous donner les soins et le soutien postopératoires en lien avec l'équipe de réadaptation, tels que : réduire au maximum votre douleur, encourager votre mobilisation, soigner votre plaie. Prévenir et dépister les complications. Préparer votre retour à domicile.

### VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR

Il y a 3 objectifs principaux à votre participation à cette phase :

1. Collaborer avec l'équipe soignante.
2. Faire tous les soins et exercices demandés.
3. Communiquer constamment avec l'équipe soignante et médicale.

Pour vous y préparer, assurez-vous de suivre, point par point, les consignes de la liste suivante.

#### Liste de vérification : À faire pour la préparation à la chirurgie

##### Quelques jours avant la chirurgie

- Cessez** tous les suppléments non prescrits par votre médecin et les produits naturels **au moins 21 jours avant votre chirurgie**, parce qu'ils peuvent interagir avec certains médicaments et entraîner des complications postopératoires sérieuses telles qu'une hémorragie, une embolie, etc. Vous pouvez toutefois continuer à prendre vos multivitamines.
- Faites le ménage de votre domicile ou demandez à quelqu'un de le faire.
- Faites votre lessive ou demandez à quelqu'un de la faire.
- Assurez-vous que votre garde-manger contient tout ce dont vous aurez besoin lors de votre retour à domicile.
- Révisez la liste de vérification : À faire pour la préparation de votre domicile (pages 18 et 19) et apportez les changements requis, au besoin.
- Ne rasez pas votre jambe pour au moins 7 à 10 jours avant la chirurgie et jusqu'à 3 semaines après la chirurgie.
- Faites vos soins de pied (couper les ongles, etc.) ou faites-les faire par un spécialiste.

- Révisez votre feuille : consignes pour votre opération (page 6).
- Préparez votre bagage pour l'Hôpital (**identifiez vos objets personnels**) :
  - o Vos articles personnels (brosse à dents, peigne, shampoing, savon, boîte de papiers-mouchoirs, serviettes humides, trousse de rasage, trousse de maquillage, serviettes sanitaires, culottes d'incontinence, etc.).
  - o Vos prothèses dentaires, auditives et lunettes si nécessaire.
  - o Des vêtements de nuit, une robe de chambre, des sous-vêtements, des chaussures ou pantoufles confortables à velcro, à semelles antidérapantes et à talons et bouts fermés (achetez-en une paire, au besoin). Après la chirurgie, vos pieds seront peut-être enflés, alors ne les prenez pas trop ajustées.
  - o Des vêtements amples et confortables (ensemble de jogging, pyjama, bas) pour pouvoir effectuer vos exercices en étant plus à l'aise.
  - o Votre marchette, votre canne ou vos béquilles, si vous en possédez. N'oubliez pas de bien les identifier.
  - o Les radios, magnétophones, baladeurs à piles sont autorisés, à condition d'être utilisés avec des écouteurs.
  - o Livres et revues, crayon et calepin.

### La veille de la chirurgie

- Enlevez tous vos bijoux et piercing.
- Enlevez tout maquillage, faux ongles et vernis à ongles aux mains et aux pieds, car au cours de la chirurgie, nous vérifions la coloration de votre peau et de vos ongles pour évaluer le taux d'oxygène dans votre sang.
- Dans les 24 heures précédant la chirurgie, ne consommez aucune boisson alcoolisée.
- Prenez un bain ou une douche complète, en prenant soin d'insister au niveau de la zone opératoire (3-4 minutes) avec la solution de chlorhexidine. Éviter d'appliquer cette solution sur votre cou, dans vos oreilles ou au visage.** Lavez vos cheveux et n'appliquez aucun produit coiffant après les avoir lavés.
- Si vous êtes colonisé par la bactérie staphylocoque (SARM), l'infirmière de la pré-admission vous avisera de la procédure à suivre.
- Ne mettez aucune crème, poudre ou parfum pour la peau (enlève l'effet de la chlorhexidine).
- Vous ne devez pas vous raser les jambes car toute lésion à la peau augmente les risques d'infection. L'équipe de soins procèdera au rasage de votre site opératoire avec un rasoir électrique quelques minutes avant votre chirurgie.**
- Changez vos draps et portez des vêtements de nuit propres.**

**Après minuit et jusqu'à la chirurgie : ne pas fumer, ne pas manger et ne pas mâcher aucune gomme, sinon votre chirurgie sera annulée. En effet, sous l'effet de l'anesthésie, les systèmes qui gardent les aliments en place dans l'estomac s'affaiblissent. Ces aliments pourraient ainsi sortir de l'appareil digestif et se retrouver dans les poumons par vomissement ou régurgitation, ce qui pourrait occasionner des problèmes graves<sup>12</sup>.**

<sup>12</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

### **Le matin de la chirurgie (avant de vous présenter à l'Hôpital)**

- Vous devez à nouveau prendre un bain ou une douche complète, en prenant soin d'insister au niveau de la zone opératoire (3-4 minutes) avec la solution de chlorhexidine. Évitez d'appliquer cette solution sur votre cou, dans vos oreilles ou au visage.** Cela assurera une propreté maximale du site à opérer et aidera à prévenir les infections.
- Lavez vos dents et dentiers.
- Si vous désirez attacher vos cheveux, utilisez un élastique sans métal.
- Ne portez pas de parfum, crème, poudre, maquillage ni vernis à ongles, aux mains et aux pieds. Pendant votre séjour hospitalier, nous vous demandons de ne pas porter de produits de soins corporels parfumés.
- Enlevez tous les bijoux, « piercings », verres de contact ou œil artificiel, car au cours de la chirurgie, nous utilisons des équipements électriques qui peuvent, en contact avec les métaux, provoquer une brûlure au 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> degré
- Laissez tous vos objets de valeur (portefeuille, cartes de crédit, bijoux, montre) à la maison. L'Hôpital n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de vol.
- Prenez les médicaments autorisés par l'infirmière et (ou) le médecin avec une gorgée d'eau (voir la liste dans votre passeport, consignes pour votre opération, haut de la page 6).
- Apportez :
  - La liste de vos médicaments 8 ½ x 11, fournie récemment par votre pharmacie (<3 mois), imprimée par votre pharmacie;
  - Les rapports médicaux des spécialistes que vous avez consultés dernièrement (si cela s'applique à vous);
  - Vos lunettes ou verres de contact, vos appareils auditifs et vos prothèses dentaires, ainsi que leur étui / contenant identifié;
  - Vos inhalateurs (pompes), appareil CPAP (si apnée du sommeil);
  - Un sac pour y mettre vos vêtements. N'apportez aucune valise en chirurgie d'un jour;
  - Vos documents d'assurance (formulaire): les formulaires d'assurance ou autres documents que doit remplir votre orthopédiste doivent être apportés à la clinique d'orthopédie au 900, boul. du Séminaire Nord, par votre accompagnateur ou par vous-même. Ne les laissez pas dans votre dossier ou à l'étage.

### **Le matin de la chirurgie, à votre arrivée à l'Hôpital**

- Soyez à l'heure à votre rendez-vous : nous vous faisons venir deux heures avant votre chirurgie pour avoir le temps de bien vous préparer. Vous pourriez être demandé plus tôt. Il est donc important de respecter l'heure indiquée. Vous arrivez à jeun et en ayant pris vos médicaments préopératoires selon la pré-admission.
- Faites-vous accompagner d'une personne responsable et disponible toute la journée. En raison de l'espace restreint, un seul accompagnateur est autorisé.

## LA CHIRURGIE D'UN JOUR (CDJ)

Il y a 2 objectifs principaux en chirurgie d'un jour :

1. Vous accueillir.
2. Vous préparer le matin de la chirurgie.

### En chirurgie d'un jour, avant la chirurgie (période préopératoire)

- Avec votre accompagnateur, vous vous présentez à l'Admission, au bureau d'inscription situé à l'Urgence, le matin de la chirurgie. Nous installerons un bracelet à votre poignet et nous vous donnerons un petit dossier préopératoire. Ensuite, nous vous dirigerons en Chirurgie d'un jour (CDJ). Pour les femmes de 10 à 50 ans, vous arrêterez au laboratoire (2<sup>e</sup> étage) pour donner votre prélèvement urinaire.
- Arrivé au poste de la Chirurgie d'un jour (CDJ), vous verrez une réceptionniste. Elle vous dirigera vers la salle de déshabillage où vous enlèverez vos vêtements, sous-vêtements, bas, bijoux et piercing. Vous mettrez une jaquette et des pantoufles. Les attaches pour les cheveux avec métal, prothèses dentaires, lunettes, verres de contact, œil artificiel ou appareil auditif s'enlèvent avant le départ pour la chirurgie. Prévoyez un contenant identifié pour les prothèses dentaires, auditives, lunettes et/ou verres de contact. Ensuite, avec votre accompagnateur, vous attendrez dans la salle d'attente que les infirmières vous appellent pour vous préparer. Vous serez appelé en CDJ pour votre préparation de la chirurgie.
- Une infirmière vous expliquera ce qui va se passer, prendra votre tension artérielle, vous questionnera sur votre état de santé.
- S'il y a eu des changements depuis votre visite avec l'infirmière en pré admission, apportez une liste de médicaments 8 ½ x 11 récente fournie par votre pharmacie.
- Ensuite, vous retournerez à nouveau dans la salle d'attente.
- Lorsque la salle d'opération sera prête pour vous opérer, un brancardier viendra vous chercher pour vous y emmener. Si votre condition vous empêche de marcher, vous irez à la salle d'opération en civière.
- Vous rencontrerez votre chirurgien et votre anesthésiologiste avant l'opération.
- Après votre départ pour la salle d'opération, votre accompagnateur devra :
  - S'occuper de vos effets personnels.
  - Retourner à la salle d'attente de la CDJ pour au moins une heure afin de demeurer disponible s'il arrivait qu'on annule votre chirurgie. Par la suite, il pourra attendre à la cafétéria (au sous-sol) ou retourner à la maison.
  - À compter de 11h30, contacter le 6<sup>e</sup> Nord (soit en s'y rendant ou en appelant au 450-359-5000, poste 5645) pour connaître votre numéro de chambre et pour vérifier si vous êtes arrivé à votre chambre.

## LA SALLE D'OPÉRATION

Il y a 2 objectifs principaux à la salle d'opération:

1. Procéder à la chirurgie.
2. Assurer la surveillance post-chirurgicale immédiate (en salle de réveil).

### À la salle d'opération

- Un membre de l'équipe viendra vous accueillir à votre arrivée à la salle d'opération.
- Il est possible qu'une des étapes de votre anesthésie se fasse à la salle de réveil.
- Afin d'assurer votre tranquillité d'esprit et votre sécurité, sachez quelle articulation et quel côté doit être opérée. On vous demandera régulièrement de confirmer ce point auprès des membres de l'équipe chirurgicale et votre site chirurgical sera marqué par votre chirurgien.
- On pourrait aussi vous redemander votre consentement à la chirurgie et à l'anesthésie. Assurez-vous que la chirurgie indiquée sur ce formulaire correspond à votre chirurgie<sup>13</sup>.
- À votre entrée dans la salle d'opération, on procèdera au rasage de la région à opérer. Nous utiliserons un rasoir électrique (tondeuse). Il est recommandé de procéder au rasage du site chirurgical dans l'heure précédant la chirurgie. On vous installera une solution intraveineuse pour vous administrer des liquides et des médicaments pendant la chirurgie.
- Dans la salle d'opération, on vous préparera pour l'opération en désinfectant le site de chirurgie. On couvrira votre corps de drap à l'exception du site de la chirurgie. L'anesthésie administrée sera celle discutée avec l'anesthésiologiste. Tout au long de la chirurgie, vous serez sous la surveillance constante d'un inhalothérapeute, d'un anesthésiologiste, des infirmières, de votre chirurgien et de ses assistants.
- La durée de l'intervention dépendra du type de chirurgie et des particularités que votre condition requiert. Habituellement, cette chirurgie prend environ 2 heures.

### Après la chirurgie, en salle de réveil

- Après la chirurgie, vous serez conduit à la salle de réveil pour une période d'observation étroite d'au moins 1 heure.
- L'infirmière vérifiera fréquemment votre pouls, votre respiration, votre pression sanguine et le site de la chirurgie.
- On pourrait vous installer un masque à oxygène pendant une courte période.
- Par voie intraveineuse, on vous administrera un médicament analgésique contre la douleur. Si vous ressentez de la douleur ou de la nausée, informez-en l'infirmière, elle pourra ajuster votre médication pour vous soulager.
- On pourrait vous demander aussi de prendre des respirations profondes.

---

<sup>13</sup> La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

- Lorsque vous serez suffisamment éveillé et que votre état le permettra, ou selon l'avis de votre anesthésiologiste, on vous transférera à l'unité de soins, généralement 1 heure après la chirurgie.

## **L'UNITÉ DE SOINS**

Il y a 4 objectifs principaux aux interventions de l'équipe soignante œuvrant à l'étage d'orthopédie :

1. Vous accueillir quand votre condition médicale est stabilisée.
2. Vous donner les soins et le soutien postopératoires en lien avec l'équipe de réadaptation, tels que : réduire au maximum votre douleur, apporter les soins appropriés à votre plaie chirurgicale, vous encourager à faire vos exercices et reprendre vos activités.
3. Prévenir et dépister les complications.
4. Préparer votre retour à domicile.

### **À votre chambre**

- Après votre chirurgie, faites apporter votre bagage à votre chambre par votre accompagnateur.
- Vous devrez changer de position au lit à toutes les 2 heures.
- Votre chirurgien orthopédiste vous prescrira votre médication habituelle.
- Vous pourrez favoriser le retour du péristaltisme intestinal en bougeant et en prenant fréquemment des marches avec l'aide de l'équipe soignante pour les premiers levers.
- Des anticoagulants (médicaments pour éclaircir le sang afin de prévenir la formation de caillots) vous seront prescrits pour quelques jours à quelques semaines après votre chirurgie (la durée peut varier selon votre prédisposition à faire une thrombophlébite). Nous vous enseignerons la technique d'injections d'anti-coagulant.
- Vous devrez faire régulièrement les exercices respiratoires à chaque heure.
- Vous devrez faire régulièrement les exercices circulatoires à chaque heure.
- Vous devrez faire régulièrement les exercices de mobilité et de force, tels qu'enseignés par l'équipe de réadaptation (3 fois par jour).
- Vous devrez marcher régulièrement, de façon progressive et selon tolérance.
- Vous devrez demander votre glace et les médicaments analgésiques dès que vous en ressentirez le besoin. N'attendez pas que votre douleur soit d'intensité sévère (voir tableau page 34).

### **À votre arrivée à l'unité de soins**

- L'infirmière évaluera régulièrement votre tension artérielle, votre pouls et votre respiration. Elle surveillera le pansement (écoulement sanguin), la température, la sensibilité et la mobilité du membre opéré, afin de prévenir les complications possibles. Elle vous donnera les médicaments particuliers

liés à votre chirurgie. Elle vous demandera votre évaluation du niveau de la douleur (0 à 10) et verra avec vous les moyens à prendre pour vous rendre confortable.

- Vous aurez un soluté et (ou) un accès veineux, pour vous hydrater et pour vous donner certains médicaments par voie intraveineuse.
- Vous pourriez aussi avoir une sonde urinaire (cathéter dans votre vessie) permettant l'écoulement de votre urine.
- Vous pourrez peut-être prendre des boissons claires et manger un goûter léger (« toasts », etc.).
- On vous dira combien de poids vous pouvez mettre sur votre jambe quand vous êtes debout ou que vous marchez.

### **Votre séjour à l'unité de soins**

- Le personnel infirmier assume les soins et les traitements en regard des exigences de votre type de chirurgie et de votre état de santé. Il voit à ce que vous soyez confortable. Il vous indique toutes les consignes à suivre. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions et faites-lui part de vos inquiétudes.
- Votre infirmière changera votre pansement 48 heures après la chirurgie si cela est nécessaire.
- Si votre état le permet, dès le jour de la chirurgie ou au plus tard le lendemain matin, vous devrez vous lever. Vous pourrez marcher jusqu'au fauteuil, puis de plus en plus loin à l'aide d'une marchette. Le personnel présent vous enseignera les consignes à suivre afin de prévenir les problèmes et complications.
- L'équipe de réadaptation commencera votre réadaptation le lendemain de la chirurgie, afin que vous retrouviez votre mobilité et votre vie régulière le plus tôt possible.
- Dès le lendemain de votre chirurgie, vous ferez votre toilette avec l'aide du préposé.
- Vous reprendrez votre régime alimentaire habituel, à moins que la nausée vous incommode.
- Il est normal que votre membre opéré enfle après la chirurgie. Il restera enflé pendant quelques mois. On vous encouragera donc à faire les exercices circulatoires et à bouger et on vous fera appliquer de la glace sur le site chirurgical. D'autres options peuvent aussi être utilisées selon le cas : des anticoagulants (médicaments), des bas anti-emboliques qui aident à prévenir les thrombophlébites.
- Si vous ne prenez pas d'anticoagulants oraux, votre infirmière vous apportera à tous les matins votre seringue d'anticoagulant pour procéder à votre injection et à votre enseignement. Elle surveillera vos étapes pour s'assurer que vous les faites de façon sécuritaire.
- Vous aurez régulièrement la visite de l'infirmière spécialisée en chirurgie. Elle suivra votre évolution et communiquera avec votre chirurgien si nécessaire.



**Vous êtes maintenant sur la voie de la guérison, où nos priorités sont <sup>14</sup> :**

- Assurer votre confort;
- Assurer votre guérison;
- Assurer votre rétablissement.

**Pour ce faire, les éléments essentiels sont :**

- A.** Réduire au maximum votre douleur;
- B.** Apporter les soins appropriés à votre plaie chirurgicale;
- C.** Prévenir et dépister les complications;
- D.** Préparer votre retour à domicile.

### **A. Réduire au maximum votre douleur <sup>15</sup>**

Réduire la douleur le plus possible est un élément important pour votre guérison. Si votre corps est stressé en raison de la douleur, votre guérison sera plus longue, vos habiletés fonctionnelles seront plus limitées, votre sommeil sera altéré et votre humeur en sera affectée. Chaque personne est unique quand il est question de méthodes les plus efficaces de soulagement de la douleur. Pour trouver le traitement qui vous convient le mieux, il peut donc être nécessaire d'essayer différentes combinaisons de médicaments (anti-inflammatoires, narcotiques) ou de varier les doses.

Voici ce que vous pouvez faire pour contribuer à réduire votre douleur :

- Parlez de votre douleur aux professionnels de la santé afin qu'ils puissent bien comprendre son type. Une façon courante de mesurer la douleur est de l'évaluer selon une échelle de 0 à 10, où 0 équivaut à aucune douleur et 10 étant une douleur insupportable.
- En décrivant votre douleur selon la sensation qu'elle provoque, vous aiderez votre équipe soignante à mieux en comprendre la nature et à choisir le meilleur traitement. Des mots comme « douleur continue », « sensation de brûlure », « élancement » et « douleur pulsatile, battante » sont utiles pour décrire la douleur.
- Le respect des consignes de positionnement vous permettra aussi d'avoir un certain contrôle sur votre douleur.
- Faites vos exercices. Bougez, changez de position, marchez de façon sécuritaire.
- Appliquez de la glace après vos exercices (page 64).
- Mettez en pratique les conseils de résolution de problèmes (page 77).
- Pratiquez la technique de relaxation (page 15).
- Quand l'anesthésie régionale ou la pompe ACP seront arrêtées, vous pourrez continuer à prendre des médicaments analgésiques par la

<sup>14</sup> La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

<sup>15</sup> *ibid*

bouche. Demandez votre médication analgésique pour que la douleur ne retarde pas votre récupération fonctionnelle. Une douleur de 5/10 ou moins est acceptable, le premier jour après la chirurgie, et de 3/10 ou moins pour les jours suivants.

Absence		Minime		Légère		Modérée		Sévère		Insupportable	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Dans la phase postopératoire immédiate, plusieurs méthodes sont utilisées pour contrôler la douleur chirurgicale : l'anesthésie régionale péridurale (dans le dos), le bloc nerveux et la pompe ACP (analgésie contrôlée par le patient). De plus, une médication par voie orale vous est donnée pour la douleur.

### Le bloc nerveux

- Afin de réduire votre douleur, l'anesthésiologiste pourrait utiliser une anesthésie régionale (bloc nerveux) en une seule dose ou laissée en place jusqu'à 24 à 48 heures ; pour ce faire, il injectera un médicament anesthésiant près d'un ou des nerfs de votre jambe.
- Avant la procédure chirurgicale, l'anesthésiologiste installe un petit tube en plastique (cathéter) à quelques centimètres sous la peau. C'est par ceci que vous recevez un anesthésique local de façon continue et automatique par une pompe surveillée par l'infirmière. La perfusion pourrait durer jusqu'à 24 à 48 heures pendant lesquelles la douleur est mieux contrôlée. Le membre demeure alors engourdi et les muscles affaiblis. **Tant que vous avez cet engourdissement et cette faiblesse, pour ne pas tomber, vous devez vous déplacer avec précaution ou avec aide.**
- Il est possible et fréquent d'avoir un écoulement de liquide clair ou teinté de sang au site d'insertion du cathéter. Il suffit d'absorber le liquide avec des compresses. Lorsque le biberon est vide ou que son utilisation est arrêtée, soit au bout de 24 à 48 heures, le cathéter est retiré.
- Lorsque le cathéter est retiré, l'effet diminue progressivement, la capacité à bouger revient en premier, la sensibilité suit. Vous ressentirez une sensation de fourmillements au retour de la sensibilité. Lorsque vous pourrez ressentir le toucher au site qui était engourdi, cela signifie que l'effet de l'anesthésie est terminé. Vous risquez alors d'éprouver de la douleur dans la région opérée.
- À son retrait, votre chirurgien vous prescrit des analgésiques (calmants). Si vous ressentez de la douleur, n'hésitez pas à les prendre régulièrement surtout les premiers jours. N'attendez pas que l'effet de l'anesthésie ait complètement disparu pour commencer à prendre les analgésiques. Donc, dès que vous commencez à percevoir la sensation de fourmillements, prenez les calmants pour que leur effet débute avant que l'effet de l'anesthésie ne disparaisse complètement.

### **La pompe ACP (analgésie contrôlée par le patient)**

- Pour les premières heures jusqu'à 48 heures, votre anesthésiologiste pourrait aussi opter pour une alternative qui vous permettrait de traiter vous-même votre douleur, sans avoir à demander à l'infirmière. Il s'agit d'une pompe contenant la médication pour la douleur.
- La pompe ACP est reliée à votre ligne intraveineuse (soluté dans le bras); ainsi, sans injection, vous avez accès à un médicament qui permet un soulagement rapide de la douleur.
- Avec la pompe ACP, vous avez donc le plein contrôle de votre douleur puisque, au besoin, vous appuyez sur un bouton, ce qui libère une quantité déterminée de médicament analgésique.
- La pompe est programmée de façon que vous puissiez vous administrer une dose maximale sécuritaire de médicament à chaque heure selon votre taille et votre poids. Ainsi, chaque fois que vous ressentez la douleur, appuyez sur le bouton. N'attendez pas que la douleur soit sévère.
- Le système ACP est très sécuritaire et permet que la médication soit utilisée à dose optimale, ni plus, ni moins. N'hésitez pas à vous administrer le traitement analgésique dont vous avez besoin. Ne laissez personne appuyer sur le bouton de la pompe ACP (famille, ami...).
- Si votre soulagement n'est pas satisfaisant ou si vous avez des effets secondaires (nausée, vomissements, démangeaisons, constipation), parlez-en avec votre infirmière.

### **B. Apporter les soins appropriés à votre plaie chirurgicale**

- Vous aurez une incision au genou de 10 à 15 cm (4 à 6 pouces), fermée par des agrafes et recouverte d'un pansement.
- Toute la jambe est entourée d'un bandage élastique pour 24 heures.
- Votre infirmière vous donnera les consignes concernant votre pansement.
- À votre départ, le suivi de votre plaie chirurgicale sera fait par le CLSC.
- L'équipe soignante vous donnera au besoin des directives sur la façon de prendre soin de votre plaie chirurgicale. N'hésitez pas à discuter de vos doutes ou incompréhensions.

### **Plaie avec bandes adhésives « stéristrips », sans agrafes :**

- Vous pouvez mettre une compresse (gaze) tenue en place par du ruban adhésif afin de couvrir votre plaie pour le confort seulement ou pour la protéger du frottement des vêtements.
- Il n'y a rien à faire si ce n'est de laisser les bandes adhésives se détacher graduellement et tomber d'elles-mêmes. Après 3 semaines, votre peau devrait être complètement guérie. Vous pourrez alors enlever les bandes restantes, au besoin.

### Plaie avec agrafes :

- Vous pouvez mettre une compresse (gaze) tenue en place par du ruban adhésif afin de couvrir votre plaie pour le confort seulement ou pour la protéger du frottement des vêtements.

Pour apporter les soins généraux appropriés à votre plaie, voici ce que vous devez faire :

- Lavez-vous toujours les mains avant de toucher à la région de votre plaie.
- Procédez aux auto-soins de la plaie tels qu'enseignés par le personnel soignant (selon votre cas).
- Le jour désigné par le chirurgien, faites enlever vos agrafes (si vous en avez) au lieu indiqué (probablement à votre CLSC).
- Après le retrait des agrafes, gardez un pansement sec (gaze) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun suintement aux points d'entrée des agrafes.
- Surveillez les signes d'infection ou d'autres complications; **si vous présentez un ou plusieurs de ces signes, contactez l'infirmière du CLSC ou Info-Santé au 811 :**
  - Rougeur qui s'étend au-delà du pourtour de la plaie;
  - Fièvre > 38 °Celsius ou 100 °Fahrenheit;
  - Coloration ou écoulement inhabituel, y compris pus;
  - Sensibilité au toucher ou enflure inhabituelle.
- Même après le retrait des agrafes ou que les « stéristrips » soient tombés, il est important de prendre soin de la région de la plaie. Vous devez laver délicatement la plaie chirurgicale avec un savon doux, bien la rincer à l'eau claire, puis l'assécher en tapotant **sans frotter. Ne pas prendre de douche ou de bain sans l'avis de votre chirurgien et si votre plaie coule ou suinte.**
- Vous devez également protéger la région de la plaie de toute blessure pendant au moins quatre semaines.

### C. Prévenir et dépister les complications <sup>16</sup>

Toutes les chirurgies comportent un risque de complications, même avec la meilleure préparation; elles sont rares, mais possibles. Votre responsabilité est de suivre les consignes de l'équipe soignante et de votre médecin, ainsi que de reconnaître les complications possibles. Vous aiderez ainsi à les prévenir ou à les réduire.

#### La nausée

La nausée est la complication postopératoire la plus fréquente. Si la nausée et les vomissements persistent, un médicament peut être administré. Après la chirurgie, on vous servira de petits repas légers pour prévenir la nausée jusqu'à ce que votre estomac fonctionne normalement et que vous puissiez recommencer à vous alimenter normalement. Si vous avez une analgésie par voie péridurale, la nausée est l'un des effets secondaires habituels. L'équipe soignante est là pour intervenir au besoin.

---

<sup>16</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

Pour prévenir ou diminuer cette complication :

- Prenez vos médicaments avec de la nourriture pour protéger votre estomac.

### **La rétention urinaire**

L'incapacité à uriner est un problème fréquent après tout type de chirurgie, mais qui revient à la normale en quelques heures ou quelques jours. Il se peut que, pour régler le problème, on insère un cathéter (tube) dans la vessie pour évacuer l'urine. Le cathéter peut rester en place pendant quelques heures ou quelques jours ou être retiré immédiatement après qu'on aura vidé la vessie.

### **La constipation**

La constipation en postopératoire peut-être associée à un changement de régime alimentaire, à la diminution de l'activité physique et aux calmants utilisés pour soulager la douleur, car ils réduisent la fonction intestinale. Des médicaments contre la constipation sont prescrits au besoin pendant votre hospitalisation. Pour prévenir cette complication :

- Il est souhaitable d'adhérer à de saines habitudes alimentaires afin de favoriser la régularité du fonctionnement intestinal. Introduisez dans votre alimentation des aliments riches en fibres : pain et céréales à grains entiers, son, légumineuses (lentilles, pois secs...), fruits et légumes, sauf si vous avez une diète spéciale qui vous en empêche.
- Hydratez-vous bien : buvez 1,5 à 2 litres d'eau par jour, afin d'optimiser l'efficacité des fibres alimentaires, sauf si vous avez une restriction liquidienne.
- Bougez le plus tôt possible et le plus possible.

### **L'enflure**

Votre jambe opérée sera enflée pendant les semaines ou mois après votre chirurgie. C'est habituel et cela varie souvent en fonction des activités que vous faites. Pour réduire l'enflure :

- Élevez votre jambe opérée (idéalement de 20 à 30 cm (8 à 12 pouces) au-dessus de niveau du cœur) pour l'incliner d'environ 15° (1 à 2 oreillers sous le mollet, sans plier le genou).
- Évitez de rester assis pendant de longues périodes.
- Faites vos exercices circulatoires (voir section) pour que le sang continue de circuler.
- Appliquez un sac de glace sur le site chirurgical les premiers jours pour contenir l'enflure.

### **Les caillots sanguins, la phlébite et l'embolie pulmonaire**

Des caillots sanguins peuvent se former dans les veines profondes plusieurs heures ou plusieurs semaines après une chirurgie, à cause, le plus souvent, de l'immobilité. Ces caillots pourraient se détacher et se rendre aux poumons (embolie pulmonaire)

ou bloquer la circulation dans vos jambes (thrombophlébite), ce qui entraînerait des risques graves pour votre santé. Les personnes à risque de faire des caillots sanguins sont celles qui : ont déjà fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, ont des problèmes cardiaques, de circulation sanguine ou d'autres problèmes de santé comme le diabète, sont inactives avec un surplus de poids ou encore, celles qui subissent une chirurgie comme une prothèse de genou.

Le symptôme d'une thrombophlébite est une douleur persistante (crampe) dans les jambes (mollets), augmentée par l'activité ou par le toucher du mollet, avec ou sans enflure, avec ou sans rougeur. Pour prévenir la formation de caillots après la chirurgie, vous aurez des bandages élastiques à la jambe opérée la première journée ou des bas compressifs (anti-embolie). Si vous portez des bas anti-embolie :

- Enlevez vos bas tous les jours pour vous laver. On vous dira si vous pouvez les enlever la nuit.
- Montez-les bien sans tourner la partie supérieure en vous assurant que le talon et le bout (orteils) sont en place. Tirez les bas vers le haut afin d'éliminer tous les plis entre la cheville et le haut des bas; puis tirez le bout des bas vers l'avant pour supprimer les replis à la cheville et au cou-de-pied (faites en sorte que les orteils soient confortables). Vous pouvez utiliser des gants de caoutchouc pour enfiler et ajuster vos bas.
- Changez de bas ou lavez-les au moins à tous les 3 jours selon les directives du fabricant (les bas peuvent habituellement être lavés dans une lessiveuse à une température < 71 ° C ou 160 ° F et séchés dans une sècheuse à < 250 ° C ou 121 ° F pour 15 à 20 minutes)<sup>17</sup>.
- On vous montrera comment enfiler vos bas. Il se peut que vous ayez à porter ces bas quotidiennement jusqu'à votre premier rendez-vous de suivi à l'orthopédiste (6 à 8 semaines postopératoires) ou tant que vous prenez des anticoagulants.

Pour prévenir les thrombophlébites, suivez également ces conseils :

- Levez-vous dès que possible, avec l'aide du personnel infirmier.
- Respirez profondément, bougez à toutes les heures vos pieds et vos chevilles (voir la section Exercices circulatoires et respiratoires à la page 59).
- Portez vos bas de soutien (si vous en portiez déjà ou si on vous en a prescrit).
- Prenez les anticoagulants selon les recommandations de votre chirurgien (voir, au besoin, la section sur l'auto-injection de l'anticoagulant à la page 39).

---

<sup>17</sup>

T.E.D. Bas antiembolie. Feuillelet d'information du fabricant : Kendall Canada Inc., Peterborough, Canada, K9J 6Z6

## AUTO-INJECTION DE L'ANTICOAGULANT (SI CELA S'APPLIQUE À VOUS)

- Il est normal de vous sentir craintif et maladroit lorsque vous préparez vos premières injections. Après l'enseignement, la pratique et la supervision, vous aurez l'habileté nécessaire pour effectuer cette injection seul en toute confiance.
- L'anticoagulant est offert en seringue prête pour l'auto-injection; aucune préparation n'est requise.
- Pour réduire les risques d'infection :
  - Lavez-vous les mains.
  - Assurez-vous que le site d'injection est propre.



### Matériel nécessaire :

- Compresse alcoolisée : permet de minimiser les risques d'infection.
- Seringue : n'enlevez pas les petites bulles d'air qui pourraient être présentes dans la seringue.
- Conservez-la à la température de la pièce et hors de la portée des enfants.



### Injection :

- Choisissez un endroit sur votre abdomen autour de votre nombril, en changeant de site à tous les jours.
- Nettoyez le site choisi au moyen d'une compresse alcoolisée et laissez-le sécher.
- Pincez la peau entre le pouce et l'index.
- De la main que vous utilisez pour écrire, tenez la seringue comme un stylo.
- Insérez l'aiguille en respectant l'angle que l'infirmière de la pré-admission vous indiquera selon l'épaisseur du pli de votre peau : 45° ou 90°.
- Assurez-vous de maintenir fermement la seringue entre vos doigts de façon à permettre le déplacement d'un doigt vers le piston pour injecter le médicament, tout en maintenant le tissu entre votre pouce et votre index.
- Poussez le piston lentement pour injecter le médicament. Attendez 5 à 10 secondes avant de retirer l'aiguille.
- Pressez la compresse alcoolisée sur le point d'injection 5 à 10 secondes, sans frotter.
- Déposez la seringue avec l'aiguille dans un contenant sécuritaire, que vous pouvez vous procurer au CLSC ou à la pharmacie.

## L'anémie (diminution des globules rouges)

Vous pouvez perdre une quantité importante de sang dans ce genre de chirurgie. Une perte de sang peut entraîner une diminution de votre taux d'hémoglobine, ce qu'on appelle « anémie ». Pour produire de l'hémoglobine, votre corps aura besoin de fer. L'hémoglobine transporte l'oxygène dans votre organisme et son taux peut être mesuré au moyen d'une analyse sanguine. Un contrôle sera fait lors de vos examens préparatoires à la chirurgie, suivi d'autres contrôles les jours 1 et 3 suivant l'opération. Si votre taux d'hémoglobine est trop bas, vous pourriez vous sentir faible et étourdi, essoufflé, très fatigué, ou vous pourriez avoir de la nausée ou un mal de tête. Il se pourrait donc que vous ayez besoin d'une transfusion sanguine; on pourrait aussi vous donner des suppléments de fer.

Pour prévenir l'appauvrissement de votre sang et la nécessité d'une transfusion sanguine :

- Dans les semaines précédant votre chirurgie, suivez le *Guide alimentaire canadien* pour manger sainement. En incorporant 2 à 3 portions du groupe viandes et substituts, vous augmentez vos réserves sanguines en fer. Votre risque de nécessiter une transfusion sanguine postopératoire sera donc diminué. Il est important de se rappeler que le fer hémique d'origine animale (viande, volaille, poisson, foie) est beaucoup mieux absorbé que le fer non-hémique d'origine végétale (lentilles, pois chiches, céréales enrichies, noix et graines, légumes verts).
- Si vous avez des antécédents d'anémie, il est préférable de discuter avec votre médecin pour évaluer la pertinence d'un supplément de fer.

## Les infections

Moins de 1 % des patients contractent une infection de la plaie après la chirurgie. Toutefois, une infection est une complication très sérieuse lorsqu'elle survient. La clé réside dans la prévention. L'infection peut commencer dans votre articulation pendant la chirurgie, à l'Hôpital ou lorsqu'une bactérie arrive d'une autre partie de votre organisme. Vous courrez plus de risque de contracter une infection si vous êtes mal nourri ou si votre système immunitaire est affaibli. De notre côté, pour réduire ces risques, nous appliquerons les règles d'asepsie pendant votre chirurgie et votre hospitalisation et nous vous donnerons des antibiotiques au moment opportun.

De votre côté, pour prévenir l'infection :

- Consultez si vous soupçonnez ou si vous voyez un ou plusieurs de ces signes d'infection :**
  - Fièvre  $\geq 38,5$  °C (101 °F).
  - Rougeur ou enflure de la plaie.
  - Écoulement provenant de la plaie.
  - Augmentation de la douleur de la plaie pendant une activité ou au repos.
- Mettez-vous en forme en mangeant sainement avant et après votre chirurgie.
- Cessez de fumer avant votre chirurgie.
- Maintenez une bonne santé buccale.
- Lavez la région opérée avant la chirurgie, tel qu'indiqué.
- Évitez les personnes qui ont un rhume ou une infection.
- Suivez les directives pour prendre soin de la plaie.
- Ne portez pas vos doigts à votre bouche et lavez-vous les mains avant de toucher votre pansement ou la plaie.



## LE LAVAGE DES MAINS <sup>18</sup> <sup>19</sup>

Au cours d'une journée, vous touchez à plusieurs objets qui peuvent avoir été contaminés par des virus ou des bactéries laissés par vous ou par d'autres personnes. Lorsque vous portez vos doigts contaminés à vos yeux, votre nez, votre bouche ou à une plaie, vous augmentez vos risques de contracter une infection. Vous devez donc vous laver les mains très souvent pour éviter de contracter une infection.

Tout le monde doit se laver les mains! Les parents, les enfants, les adultes, de même que le personnel des hôpitaux, des écoles, des garderies, des bureaux, des restaurants, etc.

### Quand se laver les mains :

- Avant et après un changement de pansement;
- Quand elles sont visiblement sales;
- Après avoir toussé ou éternué;
- Après vous être mouché ou avoir mouché un enfant;
- Avant et après avoir manipulé de la nourriture et avant de manger;
- Après être allé aux toilettes; après avoir changé une couche;
- Avant de mettre ou d'enlever vos verres de contact;
- Après avoir manipulé des ordures.

### Étapes à suivre pour se laver les mains adéquatement :

- ❶ Enlevez toutes vos bagues et mouillez vos mains sous l'eau chaude courante.
- ❷ Mettez une petite quantité de savon liquide dans la paume de la main (5 ml ou 1 c. à thé). Les savons en pain ne sont pas aussi hygiéniques parce qu'ils restent humides et attirent les germes. Si vous n'avez que du savon en pain, placez-le sur un porte-savon muni d'une grille pour permettre à l'eau de s'écouler.
- ❸ Frottez-vous les mains pendant 20 secondes pour produire de la mousse. N'oubliez pas de frotter le dos de la main, entre les doigts et sous les ongles.
- ❹ Rincez-vous bien les mains sous l'eau courante pendant au moins 10 secondes. Une fois les mains propres, évitez le plus possible de toucher aux robinets. Utilisez un essuie-tout pour les fermer.
- ❺ Séchez-vous les mains avec un essuie-tout. Si vous utilisez une serviette en tissu, changez-la tous les jours. Pendant la saison de la grippe et du rhume, chaque membre d'une famille devrait avoir sa propre serviette à mains.
- ❻ Appliquez de la lotion si vous avez les mains sèches.



**Conseil :** Il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon antibactérien.

<sup>18</sup> [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob\\_sante/influenza/index.php?lavage\\_des\\_mains](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?lavage_des_mains)

<sup>19</sup> <http://www.phac-aspc.gc.ca/chn-rcc/handwash-fra.php>

## Complications cutanées

Un ulcère de décubitus (appelé communément « plaie de lit ») peut être dû à la compression de la peau recouvrant les parties osseuses, à l'humidité ou au frottement. Il se rencontre chez les patients alités pendant une période plus ou moins longue ou présentant un mauvais état nutritionnel. Il est possible de prévenir cette complication en utilisant de bonnes techniques de soins de la peau, un couvre-matelas approprié ou un matelas spécial. Des réactions allergiques sont également possibles, allant d'un simple « rash » cutané à une réaction plus intense. Pour prévenir cette complication :

- Avisez-nous si vous avez une ou des allergies.
- Bougez régulièrement et le plus tôt possible après votre chirurgie.
- Les protéines sont essentielles pour la guérison et la cicatrisation de votre plaie chirurgicale. Pour répondre à vos besoins en protéines, assurez-vous de manger chaque jour 2 à 3 portions du groupe viandes et substituts, ainsi que 3 portions du groupe lait et substituts. Il est recommandé d'en inclure à chaque repas afin de faciliter l'atteinte de vos objectifs.

Groupe alimentaire	Nombre de portions Adulte : > 51 ans+		Exemples
	Femme	Homme	
Lait et substituts	3	3	Lait ou boisson soya enrichie : 250 ml (1 tasse) Yogourt : 175 g (¾ t) Fromage : 50 g (1½ oz)
Viandes et substituts	2	3	Viande, volaille, poisson et fruits de mer : 75 g (2½ oz) Légumineuses : 175 ml (¾ t) Tofu : 150 g ou 175 ml (¾ t) Œufs : 2 Beurre d'arachides : 30 ml (2 c. à soupe)

- Si vous êtes incapable de combler vos besoins en protéines ou de respecter le nombre de portions recommandées dans le *Guide alimentaire canadien*, que ce soit par manque d'appétit, par fatigue ou en raison de nausées postopératoires, il existe des préparations commerciales qui peuvent vous aider. Vous pouvez acheter ces suppléments, Boost® ou Ensure®, à votre pharmacie. Ils sont destinés à être ingérés en plus des aliments que vous êtes capable de consommer. Prenez-les à la fin d'un repas ou en collation. Cependant, évitez de les prendre dans les 2 heures précédant un repas, car ils pourraient nuire à votre appétit pour le repas suivant.

## Le délire postopératoire

Parfois, certaines personnes vivent une période de confusion ou de délire après une chirurgie. Il se peut qu'elles agissent ou qu'elles parlent de façon anormale. Par exemple, il est possible qu'elles commencent à oublier des choses, qu'elles soient confuses ou encore qu'elles voient, qu'elles entendent ou qu'elles croient des choses qui n'ont aucun sens. Le délire disparaît généralement en quelques jours,

mais, à l'occasion, il subsiste pendant quelques semaines. De façon générale, il est attribuable à plus d'une cause. Les effets secondaires des anesthésiques et des médicaments, le manque de sommeil, la douleur, l'infection, le sevrage d'alcool, la constipation et le faible taux d'oxygène font partie des causes courantes de délire. L'équipe soignante cherche et corrige la cause du délire dans la mesure du possible.

Pour diminuer la possibilité que cette complication se produise, vous devez :

- Appliquer les techniques de relaxation pour compenser le manque de sommeil et gérer votre stress.
- Diminuer progressivement votre consommation d'alcool.
- Limiter votre consommation de médicaments analgésiques.
- Bien vous hydrater et manger sainement durant les semaines précédant la chirurgie.
- Vous assurer d'avoir un bon fonctionnement intestinal.
- Nous informer si vous avez déjà eu ce problème lors d'une chirurgie antérieure.
- Après la chirurgie, porter rapidement vos lunettes et vos prothèses auditives.

### Complications pulmonaires

Après la chirurgie, à cause de l'anesthésie et de l'immobilité prolongée, des complications pulmonaires peuvent survenir, comme l'œdème pulmonaire ou la pneumonie.

Pour éviter ces complications, on vous lèvera le jour de la chirurgie ou au plus tard le lendemain. Votre rôle est le suivant :

- Cessez de fumer au moins un mois avant la chirurgie.
- Ne mangez pas et ne buvez rien après minuit la veille de votre opération.
- Faites vos exercices respiratoires et circulatoires tel qu'indiqué (voir page 59).
- Prenez régulièrement des grandes respirations.
- Changez de position à toutes les 2 heures (variez votre position même lorsque vous êtes couché : sur le dos, sur le côté) et bougez le plus possible.
- À l'Hôpital, si vous ressentez de la difficulté à respirer, avisez votre infirmière. À la maison, vous pouvez appeler l'infirmière d'Info-Santé au 811.**
- Si vous prenez des médicaments pour améliorer votre respiration, prenez-les avant et après votre chirurgie, tel que prescrit par votre médecin.

### Les complications cardiovasculaires

Les deux complications cardiaques postopératoires les plus courantes, **quoique très rares**, sont la crise cardiaque et l'insuffisance cardiaque. Le stress de la chirurgie peut causer une crise cardiaque chez les personnes atteintes d'une maladie

coronarienne (connue ou non). L'équipe soignante est là pour surveiller les signes de complications et intervenir au besoin.

### **Les lésions nerveuses**

Selon la région de l'incision chirurgicale (coupure), une lésion nerveuse (perte de sensibilité locale de la peau, perte de force, etc.) peut survenir en raison de la proximité des nerfs et des vaisseaux sanguins. Habituellement, la lésion est temporaire, surtout si les nerfs ont été étirés par les écarteurs pour éviter de gêner le chirurgien. Parfois aussi, elles peuvent être dues à l'anesthésie péridurale ou au bloc nerveux. Les lésions permanentes sont rares. L'équipe soignante est là pour surveiller les signes de ces complications et intervenir au besoin.

### **La perte d'appétit**

- Pour stimuler votre appétit, prenez un peu d'air frais avant les repas, si possible.
- Prenez les liquides une demi-heure avant ou une demi-heure après les repas pour éviter la sensation de gonflement.
- Présentez les aliments de façon attrayante. Variez les couleurs, les saveurs et les textures; rendez l'heure des repas aussi agréable que possible.
- Souvent, il est préférable de prendre 3 petits repas et d'ajouter 3 collations.
- Utilisez des mets prêts à manger ou faciles à préparer. Cuisinez lorsque vous êtes en forme et congelez les mets en portions-repas.

## **D. PRÉPARATION DU RETOUR À DOMICILE**

<b>Durée de séjour à l'Hôpital :</b>	2 à 4 jours
<b>Durée de la convalescence :</b>	environ 3 mois
<b>Arrêt de travail :</b>	à discuter avec votre orthopédiste
<b>Conduite automobile :</b>	6 à 8 semaines ou selon l'avis de votre médecin

### **Avant de quitter l'Hôpital :**

- On changera votre pansement au besoin et on vous avisera des soins à apporter à la plaie opératoire.
- Votre professionnel de la physiothérapie vous donnera les directives à suivre quant à vos exercices et à la suite de votre réadaptation.
- On vous informera des restrictions qui s'appliquent.
- On s'assurera que vous utilisez adéquatement les équipements fonctionnels (marchette, canne, pince à long manche...) dont vous avez besoin.
- Vous recevrez une ordonnance pour tous les médicaments dont vous aurez besoin : anticoagulants, analgésiques, anti-inflammatoires, etc. Des explications vous seront données par l'infirmière.

- Vos prochains rendez-vous avec l'orthopédiste (clinique externe d'orthopédie) vous seront communiqués par téléphone dans les 10 à 14 jours suivant votre retour à domicile.
- Les arrangements pour votre rendez-vous en réadaptation externe et le suivi par le CLSC (infirmière) seront faits par le personnel avant votre congé de l'hôpital.
- Selon le cas, on indiquera dans votre passeport et directives générales vos prochains rendez-vous avec l'orthopédiste.
- La planification de votre sortie de l'Hôpital sera revue avec vous dès les premiers jours de votre hospitalisation, ainsi que l'identité de votre accompagnateur qui vous ramènera à la maison.

### **Critères médicaux pour un congé de l'Hôpital**

Nous évaluerons régulièrement si vous avez atteint les critères qui vous permettront un retour à domicile sécuritaire. Nous pourrions envisager votre congé de l'Hôpital si :

- Votre état physique, cognitif et psychosocial est stable. Plus spécifiquement lorsque :
  - Le fonctionnement des systèmes physiologiques (cardiaque, respiratoire, digestif, etc.) est revenu au niveau préopératoire.
  - Vous êtes alerte et bien orienté dans toutes les sphères.
  - Vous mangez bien et n'avez pas de nausée ni de vomissements.
  - Vos selles sont normales et vous n'avez pas de problèmes urinaires.
  - Votre douleur est bien contrôlée.
  - Les résultats de laboratoire sont normaux.
  - La plaie opératoire n'a pas de signes d'infection.
- Il n'y a aucune complication majeure anticipée, ni réaction au traitement.
- Vous et votre réseau d'aidants naturels êtes préparés à poursuivre à domicile votre plan d'intervention.
- Votre accompagnement et votre transport sont organisés.
- Vous et vos proches comprenez le traitement et la surveillance à apporter et vous êtes capables de déceler des problèmes concernant :
  - Vos médicaments : auto-injection de l'anticoagulant, au besoin.
  - L'autogestion de votre douleur postopératoire.
  - Votre plaie opératoire.
  - Vos exercices.
  - La reprise de vos activités.
  - Les signes et symptômes de complications.
  - La prévention des chutes.

### **Critères de réadaptation pour un congé de l'Hôpital**

Si votre condition médicale est stable et que les complications survenues sont contrôlées ou soignées, voici nos critères pour prendre cette décision :

- Les équipements nécessaires à vos déplacements et à vos activités fonctionnelles sont en place à domicile.

- Vous êtes autonome et sécuritaire dans vos transferts assis-debout, debout-assis (chaise / toilette) avec l'utilisation des équipements, si nécessaire.
- Vous pouvez entrer et sortir du lit de façon sécuritaire avec ou sans assistance.
- Vous pouvez vous habiller (le bas du corps) de façon autonome ou avec l'assistance de vos aidants naturels ou au moyen des aides techniques.
- Vous pouvez marcher avec une marchette de façon sécuritaire sur une distance de 15 mètres.
- Vous êtes autonome et sécuritaire dans les escaliers, selon les conditions présentes à votre domicile (nombre de marches, mains courantes, aidants naturels...).
- Votre état cognitif est semblable à ce qu'il était avant l'hospitalisation ou fonctionnel pour le retour à la maison (perception, mémoire, raisonnement).

### **Notre politique de visite**

- Les heures de visite sont de 14h à 20h, 7 jours par semaine, afin de privilégier le bien-être et le rétablissement des patients, leur sécurité et celle de leurs biens personnels ainsi que la prévention des infections. Toutefois, la présence de votre accompagnateur (proche aidant) est admise en tout temps.
- Le nombre de visiteurs, accompagnateurs, proches aidants) auprès d'une personne hospitalisée est limité à deux à la fois. Certaines particularités peuvent s'appliquer (soins intensifs, etc.).
- Notez que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis auprès des personnes hospitalisées. Informez-vous de la politique en vigueur.
- Les visiteurs ont accès à un terrain de stationnement. Les frais sont basés sur un taux horaire, avec un tarif maximum pour une journée.
- Pour plus d'information, consultez le guide d'accueil pour la clientèle hospitalisée à l'Hôpital (Édition 2013).

### **Notre politique d'heure de congé :**

- Assurez-vous d'avoir quelqu'un disponible pour venir vous chercher dès la deuxième journée après votre chirurgie. Quand vous aurez atteint les critères pour un congé sécuritaire, nous vous demanderons de retourner à domicile.

### 3 - PHASE POSTHOSPITALIÈRE

PHASE	ACTEURS	ACTIVITÉS
③ POSTHOSPITALIÈRE	Vous-même et votre accompagnateur	Faire tous les soins et exercices demandés. Favoriser une récupération optimale de votre fonction. Assurer la prévention et la surveillance des complications. Communiquer constamment avec l'équipe soignante et médicale.
	Soutien à domicile	Assurer, au besoin, le soutien et le suivi de votre condition physique (infirmière).
	Physiothérapie externe	Poursuivre votre réadaptation.
	Orthopédiste	Assurer le suivi de votre chirurgie.

#### VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR

Il y a 4 objectifs principaux à cette phase, en ce qui vous concerne :

1. Faire tous les soins exercices demandés quotidiennement.
2. Favoriser une récupération optimale de votre fonction.
3. Assurer la prévention et la surveillance des complications.
4. Communiquer constamment avec l'équipe soignante et médicale.

Lors de votre retour à la maison :

- Assurez-vous de mettre à contribution votre accompagnateur ou d'obtenir de l'aide de votre famille ou d'un ami pour les tâches quotidiennes de la maison et pour vos déplacements à vos rendez-vous.
- Continuez votre traitement anticoagulant, de même que les exercices circulatoires jusqu'à la date indiquée par le chirurgien.
- Attention, tous les calmants peuvent produire de la constipation; soyez actif, adoptez au besoin un régime alimentaire riche en fibres et prenez du jus de pruneaux; buvez 8 à 10 verres d'eau par jour (1.5 à 2 litres), sauf si vous avez une restriction liquidienne ou une diète spéciale. Un suppositoire de glycérine peut être utilisé, en dernier recours.
- Attention, les calmants peuvent produire de la nausée; si c'est le cas, prenez vos analgésiques avec des aliments. Si la situation persiste, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin qui pourraient vous conseiller une médication complémentaire pour votre estomac.
- Évitez la consommation d'alcool si vous prenez des analgésiques.
- Si votre médication analgésique vous cause de la somnolence, essayez de prendre de plus petites doses.

- Continuez à prendre la médication proposée et à appliquer les conseils, pour diminuer votre douleur, pour conserver votre énergie, pour faciliter votre positionnement. Si votre douleur n'est malgré tout pas contrôlée, contactez l'infirmière de la Clinique d'orthopédie.
- Vous pouvez connaître quelques difficultés de concentration si vous avez subi une anesthésie générale. Cette situation s'améliorera avec le temps. Respectez les indications que vous avez reçues concernant la conduite automobile et ne prenez pas de décisions importantes, telles que la signature de contrats légaux, tant que vos capacités mentales ne sont pas revenues à leur niveau habituel.
- Vous pouvez prendre une douche, 2 jours après le retrait des agrafes / points et lorsque l'écoulement de la plaie a cessé. Asséchez bien la région de votre plaie en tapotant, **sans frotter**. Attendez l'autorisation de votre chirurgien avant de prendre un bain. **S'il y a suintement de la plaie, ne pas prendre de douche ou de bain.**
- Surveillez et soignez votre plaie chirurgicale selon les consignes reçues à l'Hôpital.
- Vous ne devez pas raser votre jambe pour au moins 3 semaines après la chirurgie et tant que vous serez sous les anticoagulants.
- Ne conduisez pas tant que votre chirurgien ne vous en donnera pas l'autorisation.
- Pour un conseil santé, vous pouvez rejoindre par téléphone, **en tout temps**, le personnel d'Info-Santé au **811**.

### Conseils pour le rétablissement et l'autogestion de votre douleur <sup>20</sup>

- Un peu de douleur est normal après une chirurgie comme la vôtre. Comme chacun est différent apprenez à connaître vos limites et à les respecter en dosant vos activités selon votre niveau de douleur. Continuez à prendre vos analgésiques au besoin. La douleur s'atténuera progressivement.
- Soyez actif; augmentez graduellement votre degré d'activité tel que suggéré par l'équipe soignante en alternant les périodes d'activité et les périodes de repos.
- Reposez-vous quand vous en sentez le besoin, mais ne restez pas alité une fois rendu à la maison. Tentez de changer de position à toutes les 45 minutes pour éviter l'inconfort dû à la raideur; l'idéal est de marcher, au moins, de courtes distances.
- Si votre jambe a tendance à enfler, allongez-vous une quinzaine de minutes plusieurs fois par jour avec la jambe élevée plus haut que votre cœur. Vous pourriez profiter de ce moment pour appliquer de la glace au besoin. Vous pourriez aussi élever votre jambe avec un oreiller sous le mollet, pour créer un angle de la hanche de 15°; attention de ne pas plier le genou.

---

<sup>20</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)



- Suivez le programme d'exercices (page 59) au moins deux fois par jour (idéalement 3 ou 4 fois) afin d'améliorer votre endurance et d'assurer un retour complet de votre mobilité.
- Servez-vous des équipements d'assistance à domicile ou des accessoires fonctionnels (page 75) afin de protéger la plaie et l'articulation opérée et réduire le stress auquel elles sont soumises.
- Utilisez votre aide à la marche (marchette, canne ...) le temps de développer un patron de marche normal. **Rappelez-vous qu'il vaut mieux marcher avec une canne sans boiter que de boiter en marchant sans canne.**
- Assoyez-vous sur des fauteuils munis d'appuis-bras pour vous relever plus facilement.
- Mangez sainement en suivant le guide alimentaire canadien.
- Suivez les directives reçues à votre sortie de l'Hôpital à propos de la douche, de l'activité sexuelle, du retour au travail et de la conduite automobile.

## LE SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE OU LE CLSC

L'objectif principal est d'assurer le soutien et le suivi de votre condition physique. Ainsi, 24 à 48 heures après votre retour à domicile, un professionnel de la santé du CLSC communiquera avec vous pour prendre un rendez-vous le jour même. L'infirmière assurera le suivi de votre condition physique et vous offrira les soins appropriés (changements de pansement, etc.). Si vous avez des points ou des agrafes, ils seront retirés environ 10 à 14 jours après la chirurgie. L'infirmière du CLSC vous donnera les consignes à cet effet. Après la visite de l'infirmière du CLSC, si votre plaie commence à couler (suinter), avisez l'infirmière du CLSC. **Si votre plaie coule, aucune douche ou bain n'est permis.**

## LE SERVICE EXTERNE DE PHYSIOTHÉRAPIE

L'objectif principal de ce service est de poursuivre votre réadaptation. À votre congé de l'hôpital, vous serez informé de la date de votre premier rendez-vous à la clinique externe de physiothérapie. Jusqu'à ce rendez-vous et par la suite, vous devez continuer votre programme d'exercices à domicile. N'hésitez pas à **prendre vos analgésiques** avant de vous rendre à vos traitements. Les traitements de physiothérapie seront continués en externe jusqu'à ce que vous ayez atteint des critères d'autonomie fonctionnelle à la marche et dans les escaliers.

À noter que la majorité des patients auront congé de physiothérapie au maximum après 8 à 12 semaines post-chirurgie. Il est important de comprendre que l'amplitude articulaire post chirurgie dépend de l'amplitude articulaire pré-chirurgie.

Pour ce qui est d'améliorer votre niveau fonctionnel au-delà de ces objectifs, cela est votre responsabilité comme pour la population en général. Nous vous encourageons à vous inscrire dans un centre sportif, aller à la piscine, prendre des cours (danse, taï chi, yoga..) ou consulter un professionnel de la physiothérapie dans une clinique privée.

## LE RETOUR AU TRAVAIL

La majorité des patients ne peuvent pas retourner au travail pendant au moins les 8 premières semaines après leur chirurgie. Par contre, si votre emploi est sédentaire et que votre condition de santé le permet, vous pourriez reprendre plus rapidement vos activités professionnelles.

- Discutez de ce point avec votre chirurgien lors de la première visite de suivi.
- Même si vous retournez au travail, assurez-vous de continuer vos exercices.
- Selon votre type de travail, discutez avec votre employeur de vos besoins spéciaux : changements fréquents de position, élévation de votre jambe, temps pour les exercices.

## LA REPRISE DES ACTIVITÉS <sup>21 22</sup>

### Activités à reprendre immédiatement :

- Dès votre retour à la maison, la marche est l'activité à privilégier.
- Quand votre plaie est bien guérie (3 semaines) la natation est aussi un bon choix, à condition que la piscine soit pourvue d'un escalier avec main courante. Prenez soin de respecter votre douleur.

### Activités à reprendre après 6 semaines (sauf avis contraire de votre orthopédiste) :

- Conduite automobile, si vous répondez aux exigences de la SAAQ.
- Bicyclette stationnaire (peut être utilisée avant en tant qu'exercice de mobilité).
- Natation dans n'importe quelle piscine.
- Danse sociale.
- Discutez avec votre chirurgien des autres activités de loisir ou sportives qui vous intéressent.

### Activités à reprendre après 3 mois (sauf avis contraire de votre orthopédiste) :

#### Attention aux risques de chute.

- Soulever des charges moyennement lourdes.
- Jardinage : assis sur un petit banc.
- Entretien et tonte de la pelouse.
- Golf.
- Quilles, pétanque.
- Bicyclette à l'extérieur (pas de vélo en montagne).
- Tennis en double (occasionnellement).
- Ski de fond classique.
- Raquette.

### Activités à discuter avec votre chirurgien :

- Vélo en montagne.
- Ski de descente ou ski de fond (pas de patin).
- Voile.
- Canot.
- Randonnées en montagne.
- Équitation.
- Patinage à glace ou à roue.

### Activités à haut risque (contre-indiquées) :

- Tennis en simple.
- Course, jogging.
- Squash, racquetball.
- Aérobic à hauts impacts.

<sup>21</sup> A Guide for Patients Having Hip or Knee Replacement, Holland Orthopaedic & Arthritic Centre, Sunnybrook, Toronto

<sup>22</sup> Kuster M.S. Exercise Recommendations after Total Joint Replacement, Sports Medicine, 2002: 32 (7) 433-445

## VISITE EN ORTHOPÉDISTE

L'objectif principal de la première visite postopératoire à l'orthopédiste en clinique externe d'orthopédie est d'assurer le suivi de votre chirurgie. Vous aurez donc un rendez-vous de suivi 4 à 6 semaines après votre chirurgie. **L'agente administrative de la clinique externe d'orthopédie communiquera avec vous dans les 10 à 14 jours suivants votre congé de l'Hôpital pour vous donner votre rendez-vous.** Toutefois, si vous ne recevez pas d'appel après ce délai, communiquez avec la clinique externe d'orthopédie au 450-359-5000, poste 2162 pour obtenir votre rendez-vous.

Lors de cette visite, l'équipe de la clinique externe d'orthopédie s'assurera que votre condition évolue normalement. Il se peut qu'on vous fasse passer certains tests radiologiques ou cliniques pour mesurer votre évolution.

- Inscrivez vos questions.
- Informez l'orthopédiste de toute complication qui aurait pu se produire et être traitée par un autre médecin que lui.
- Assurez-vous de comprendre les consignes : précautions, restrictions de certaines activités ou sports.
- Demandez au chirurgien la date prévue de votre prochaine visite.
- Vérifiez avec lui si vous pouvez reprendre la conduite automobile.
- Discutez de votre retour au travail avec l'orthopédiste.
- Assurez-vous de recevoir les informations nécessaires sur les antibiotiques à prendre avant un traitement dentaire ou avant certaines interventions chirurgicales (si cela s'applique à vous).
- Assurez-vous que votre médication soit adéquate et suffisante.

## POINTS À SURVEILLER

**AVISEZ LA CLINIQUE EXTERNE D'ORTHOPÉDIE AU 450-359-5000 POSTE 2162 OU  
INFO-SANTÉ AU 811 SI :**

### Signes d'infection de la plaie :

- La région autour de la plaie devient de plus en plus rouge, chaude et très enflée.
- Les bords de l'incision se séparent.
- Il y a écoulement de liquide (vert, jaune ou pus) au niveau de votre genou.
- Il y a une mauvaise odeur provenant de votre plaie.
- Vous avez de la fièvre (> 38,5 °C ou > 101 °F, température prise 30 minutes après manger ou boire) pendant plus de 24 heures.

### Signes de saignements excessifs :

- Vos urines sont rouges ou foncées.
- Vos selles sont rouges ou foncées.
- Vous avez des saignements des gencives ou du nez.
- Vous avez des ecchymoses excessives (bleus).

### PRÉSENTEZ-VOUS À L'URGENCE SI :

#### Signes de thrombophlébite :

- Vous avez une douleur persistante dans les jambes (mollets) ou les bras, augmentée par l'activité ou par le toucher, avec ou sans enflure.

#### Signes d'embolie pulmonaire :

- Vous avez une douleur ou un point à la poitrine.
- Votre respiration est difficile ou sifflante ou vous êtes essoufflé même au repos.
- Vous avez des sueurs inexplicables.
- Vous devenez confus.
- Vous avez un point à l'épaule lors d'une respiration profonde.

### RECOMMANDATIONS SPÉCIALES

- Tant que vous êtes sous anticoagulants, prévenez les coupures et blessures en :
  - Vous rasant avec précaution, idéalement avec un rasoir électrique (homme).
  - Utilisant une brosse à dents souple.
  - Coupant vos ongles avec précaution.
  - Portant des chaussures en tout temps.
  - Respectant les consignes de prévention des chutes.
- Si vous devez subir une chirurgie dentaire ou autre, vous devez aviser votre dentiste ou votre médecin que vous avez une prothèse de genou. Il se pourrait que vous ayez à prendre des antibiotiques avant tout traitement dentaire.
- Avisez votre médecin de famille si vous développez une infection quelconque : urinaire, dentaire, à la gorge... Un antibiotique pourrait être nécessaire.

## 4 - VIVRE AVEC SA PROTHÈSE

PHASE	ACTEURS	ACTIVITÉS
④ VIVRE AVEC SA PROTHÈSE	Orthopédiste	Assurer la surveillance de votre condition en lien avec votre prothèse.
	Vous-même et votre accompagnateur	Suivre les conseils reçus. Poursuivre le programme d'exercices et adopter de saines habitudes de vie.

### VOTRE ORTHOPÉDISTE

Vous aurez des visites régulières avec votre orthopédiste en clinique externe d'orthopédie pour vérifier la bonne position de votre prothèse et pour déceler les signes éventuels de complications tardives comme une infection, un décèlement de la prothèse, etc. Ces complications sont rares et parfois difficiles à déceler car elles demeurent sans symptômes; il est donc nécessaire d'en assurer la surveillance. Votre orthopédiste vous indiquera à quelle fréquence il juge pertinent de vous revoir.

- Inscrivez vos questions.
- Informez l'orthopédiste de toute complication qui aurait pu se produire et être traitée par un autre médecin que lui.
- Assurez-vous de comprendre les consignes.

### VOTRE IMPLICATION ET CELLE DE VOTRE ACCOMPAGNATEUR

#### À QUOI DEVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE? <sup>23</sup>

Il est assez courant de continuer à ressentir de la douleur autour de la plaie opératoire. Plusieurs mois peuvent s'écouler avant que vous n'obteniez les résultats escomptés, alors ne vous découragez pas.

- Continuez à suivre les conseils reçus.
- À tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'infirmière de la Clinique d'orthopédie.

Vous connaîtrez une amélioration progressive jusqu'à 5 ou 6 mois après la chirurgie. Par la suite, l'amélioration se fera plus lentement. Il a été démontré que même après un an ou plus, l'activité peut augmenter à mesure que la force musculaire continue à s'améliorer.

<sup>23</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

## LES RISQUES EN LIEN AVEC LA PROTHÈSE?

Les infections sur prothèses peuvent provenir d'un foyer infectieux mal soigné : panaris, ongle incarné, infection de la sphère oreille / nez / gorge (sinusite, laryngite, etc.), bronchite, infection urinaire. N'hésitez pas à consulter rapidement votre médecin de famille en cas d'infection pour un examen et une éventuelle prescription d'antibiotiques.

- Assurez-vous d'avertir votre dentiste et les autres médecins que vous consultez que vous avez subi une arthroplastie (un remplacement de votre genou). Même durant un examen dentaire de routine, vous pourriez courir le risque de contracter une infection. Une petite infection peut constituer un problème important, et les professionnels de la santé qui vous traitent savent quelles précautions prendre. C'est à vous de les tenir au courant<sup>24</sup>.

## LES CONTRE-INDICATIONS POSTOPÉRATOIRES (4 À 8 SEMAINES)

Suite à votre chirurgie, il n'y a pas de contre-indication absolue. Par contre, il est déconseillé :

- de mettre trop de poids (porter des objets lourds en appui sur la jambe opérée);
- d'appliquer des forces d'impact sur le membre opéré (sauts);
- de pratiquer des activités à risque de blessure (sports de contact);
- de faire des pivots sur cette jambe.

La douleur sera votre meilleur guide. Il se peut donc que les positions à **genoux, accroupi ou à 4 pattes** ne soient plus possibles comme par exemple : laver le plancher ou le bain à genoux par terre, s'agenouiller, etc.

- Les trois premières semaines, il est déconseillé de **prendre un bain ou d'aller à la piscine**, afin de laisser bien guérir votre peau au site chirurgical.

---

<sup>24</sup> Document : La planification pour des résultats optimaux : Préparation en vue de votre chirurgie. Fondation canadienne d'orthopédie. [www.canorth.org](http://www.canorth.org)

## FOIRE AUX QUESTIONS

### *Quel est le délai pour obtenir un résultat définitif?*

Il faut plusieurs mois pour tirer tout le bénéfice de la chirurgie. La reprise de l'activité doit s'effectuer de façon harmonieuse et progressive au cours des 2 mois suivant la chirurgie (amplitude des mouvements, travail musculaire, etc.). Peu à peu, vous allez acquérir la plupart des bénéfices que peut apporter une prothèse. En pratique, il faut environ 6 à 12 mois pour obtenir le résultat optimal après une chirurgie au genou.

### *Peut-on vivre normalement avec une prothèse?*

Il est possible de vivre normalement avec une prothèse dans les conditions habituelles d'activités quotidiennes. Notre conseil : tenez compte de votre âge et de vos capacités physiques avant la chirurgie pour vous fixer des objectifs réalistes.

### *Pratiquer un sport?*

Rien n'est formellement interdit. Tout dépend de l'âge, de l'état de santé, du sport pratiqué et des capacités physiques avant la chirurgie. Il faut toutefois être plus modéré dans votre pratique et pondérer vos passions : un genou prothétique est plus fragile qu'un genou normal. Une personne ayant bénéficié de la mise en place d'une prothèse peut faire du vélo, du ski non agressif, nager, etc., à condition d'avoir déjà pratiqué ces activités avant la chirurgie. **Évitez** celles qui soumettent la prothèse à trop de contraintes ou les sports de contact (course, sauts, judo, karaté, sports d'équipe, etc.). À **conseiller** plutôt : la natation (après 3 semaines), la marche, le golf, le vélo, en respectant vos limites et votre douleur.

### *Partir en voyage?*

Dans la majorité des cas, il n'y a pas de précautions particulières pour voyager, sauf que nous vous recommandons **d'éviter les longs trajets en avion pendant les 3 premiers mois**<sup>25</sup>. Quand vous êtes dans l'avion, n'oubliez pas de faire vos exercices circulatoires (pompage des chevilles) au moins à toutes les heures. Il est indispensable de souscrire une bonne assurance incluant le rapatriement sanitaire en cas de problème. En cas de déplacement dans un pays lointain dont le système de santé est rudimentaire, consultez votre médecin de famille un mois auparavant pour faire le point. Il faut savoir que les portiques de détection des aéroports peuvent déceler l'acier de la prothèse. Prévoyez dans ce cas devoir montrer votre incision chirurgicale (cicatrice).

### *Doit-on suivre un régime alimentaire particulier?*

Surveillez votre poids, l'obésité étant l'ennemie des prothèses de genou. Un régime alimentaire varié et équilibré, associé à une activité physique régulière, est dans tous les cas conseillé.

### *Quelle est la durée de vie d'une prothèse?*

Votre prothèse de genou pourrait vous durer toute votre vie. Cela dépendra de votre âge, de votre poids corporel, de vos activités, des stress que vous lui ferez subir et de la réaction de votre corps à cet implant. Selon votre âge et d'autres facteurs, une chirurgie de révision de prothèse pourra être envisagée si cette prothèse présente un problème.

---

<sup>25</sup> [http://guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc\\_id=10786&string=](http://guideline.gov/summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=10786&string=)



# VOTRE RÉADAPTATION

## VOTRE RÉADAPTATION TOUT AU LONG DU CONTINUUM

Votre réadaptation commence par la rencontre de groupe et se poursuivra progressivement jusqu'à votre récupération maximale (jusqu'à une année).

La réadaptation est essentielle pour vous qui allez subir une chirurgie de remplacement du genou. Elle vous permettra de récupérer votre autonomie et de reprendre la majeure partie de vos activités antérieures le plus rapidement possible. Le personnel infirmier et auxiliaire est aussi très présent pour vous aider à vous mobiliser le plus tôt possible.

Votre programme d'exercices est important. **Débutez-le maintenant** et de façon régulière avant la chirurgie, il vous permettra de maintenir la qualité de vos muscles et de récupérer plus rapidement et surtout plus facilement. Ces exercices améliorent la force musculaire, la mobilité, l'endurance et la coordination de votre genou et de votre jambe en général. Le programme enseigné vous sera utile avant et après la chirurgie.

Durant votre hospitalisation, le professionnel de la physiothérapie adaptera, selon votre type de chirurgie, le programme d'exercices ainsi que le moment opportun pour débiter chacun des exercices. **Il est important de ne faire que les exercices recommandés.**

- Faites les exercices indiqués à tous les jours.
- Répétez chacun des exercices 10 fois.
- Tenez l'exercice de 5 à 6 secondes sans bloquer votre respiration.
- Répétez le programme complet 3 fois par jour.

N'oubliez pas de faire les exercices lentement et de vous reposer entre chacun des exercices.

**Les feuilles à bordures bleues** qui suivent sont un aide-mémoire des « **exercices à faire** ». « Commencez **dès aujourd'hui** ». Il est important de bien suivre les consignes tout au long de votre réadaptation.

Nous sommes là pour vous accompagner, mais vous devez apprendre graduellement à exécuter par vous-même (ou avec l'aide de votre accompagnateur) vos exercices, vos déplacements, vos transferts, vos soins corporels et votre habillage car vous devrez continuer à la maison dès votre retour.

**Nous vous souhaitons une bonne réadaptation avec notre équipe  
et un prompt rétablissement !**

## LES BUTS DE LA RÉADAPTATION PENDANT LA PHASE HOSPITALIÈRE SONT :

- Diminuer votre douleur et l'enflure;
- Assurer votre sécurité dans les activités quotidiennes;
- Vous encourager à bouger, à faire vos exercices et à marcher;
- Vous préparer à prendre en main votre réadaptation et votre retour à domicile en toute sécurité.

## VOICI UN APERÇU DE CE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT PENDANT VOTRE SÉJOUR :

- **Jour 0 (jour de la chirurgie) :**
  - ▶ Débutez vos exercices respiratoires et circulatoires (**voir feuilles à bordures bleues**).
- **Jour 1 :**
  - ▶ Débutez votre programme d'exercices tout en contrôlant votre douleur.
  - ▶ Le personnel soignant vous aidera à vous asseoir au bord du lit.
  - ▶ Premier lever avec l'aide du personnel afin d'éviter des complications (pulmonaires, phlébite, etc.)
  - ▶ Nous vous encouragerons dans la pratique de votre programme d'exercices, tout en contrôlant votre douleur.
  - ▶ Vous devrez vous lever avec aide et peut-être marcher plusieurs fois par jour, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez le faire seul en toute sécurité.
  - ▶ Vous vous déplacerez avec une marchette (fournie par l'Hôpital). Vous pourrez mettre du poids progressivement sur votre jambe, selon l'avis de votre chirurgien.
- **Jour 2 :**
  - ▶ Tout sera mis en place pour vous encourager à être de plus en plus autonome dans vos déplacements (vers la toilette, le fauteuil, dans le couloir), dans vos soins corporels et votre habillage.
  - ▶ Vous poursuivrez les exercices (**voir feuilles à bordures bleues**).
  - ▶ On s'assurera que vous exécutez adéquatement vos activités fonctionnelles permettant votre retour à domicile : soins personnels, marche, escaliers (jour 2 ou 3).
  - ▶ Si votre condition le permet, vous pourriez retourner à domicile.
- **Jour 3 :**
  - ▶ Vous poursuivrez vos exercices (**voir feuilles à bordures bleues**) et nous vous donnerons les directives à suivre quant à la suite de votre réadaptation lors de votre retour à domicile.
  - ▶ On finalisera les préparatifs pour votre retour à domicile. Si tout va bien, vous recevrez votre congé de l'Hôpital.
  - ▶ On vous informera des restrictions s'il y a lieu.
  - ▶ De retour à domicile, vous poursuivrez votre réadaptation selon le programme d'exercices inclus dans ce document et il sera ajusté lors de votre premier rendez-vous en clinique externe de physiothérapie.

# PROGRAMME D'EXERCICES POUR UNE CHIRURGIE DE PROTHÈSE TOTALE DE GENOU

## CONSEILS

1. Ne faites que les exercices recommandés (voir crochets).
2. Tenez la position obtenue lors de l'exercice de 5 à 6 secondes sans bloquer votre respiration. Répétez 10 fois, ou selon l'indication de votre thérapeute, 3 fois par jour.
3. Si la douleur augmente, diminuez le nombre de répétitions ou l'amplitude du mouvement.
4. À la maison, vous pouvez faire des applications de glace (pendant 20 minutes) s'il y a œdème (enflure) et/ou douleur aiguë. S'il y a une plaie, attention pour ne pas la mouiller (voir glace ou chaleur page 64).
5. Vous devez toujours avoir un **alignement parfait** de la jambe : pied, genou, hanche bien alignés, sans torsion. Il est important de maintenir cet alignement pour : faire vos exercices, vous asseoir, vous relever, marcher, monter les escaliers, et pour rester au lit ou assis.
6. Faites les exercices pour les deux jambes, un côté à la fois.



## EXERCICES RESPIRATOIRES

Pré-admission     Post-opératoire

- Gonflez le ventre en faisant entrer l'air par le nez, garder 3 secondes puis faire sortir l'air doucement par la bouche en rentrant le ventre (comme pour éteindre une chandelle).



## EXERCICES CIRCULATOIRES

Pré-admission     Post-opératoire

- Tirez le pied vers le nez.
- Poussez le pied vers le bas.
- Faites de grands cercles.
- Pliez et étendez vos orteils.
- **Faites les exercices en alternance 30 fois en 1 minute ou plus; répétez à toutes les heures.**



# EXERCICES DE MOBILITÉ ET RENFORCEMENT

## EXERCICES FAITS AU LIT

### ➤ Mobilisation de la rotule

- Pré-admission     Post-opératoire

Demi-assis ou assis, placez une petite serviette roulée sous votre genou, prenez les 4 coins de votre rotule entre vos pouces et vos index; sans écraser votre rotule contre votre fémur, bougez votre rotule dans les 4 directions (vers la cuisse – vers le pied; vers la droite – vers la gauche) en tenant l'étirement à chaque fin de mouvement.



### ➤ Flexion genou

- Pré-admission     Post-opératoire

Couché sur le dos ou demi-assis, glissez le pied vers la fesse pour plier votre genou.



### ➤ Flexion genou

- Pré-admission     Post-opératoire

Demi-assis ou assis, vous pouvez vous aider avec les mains ou une serviette sous la cuisse pour plier votre genou.



- Pré-admission     Post-opératoire

Progresser l'exercice en utilisant une courroie attachée au pourtour de votre cheville.



### ➤ Extension genou

- Pré-admission     Post-opératoire


Couché sur le dos, un rouleau sous la cheville, poussez le genou vers le matelas pour étirer les muscles derrière le genou.



➤ **Renforcement de la cuisse**

Pré-admission     Post-opératoire

Demi-assis ou assis, poussez le genou opéré dans le matelas et tirez le pied vers le nez, contractez bien la cuisse (voir DVD « Exercices circulatoires B »).



➤ **Renforcement co-contraction de la cuisse**

Pré-admission     Post-opératoire

Demi-assis ou assis, écrasez le genou et le talon dans le matelas.



➤ **Extension terminale genou**

Pré-admission     Post-opératoire

Couché sur le dos ou demi-assis, un rouleau sous le genou, poussez le genou dans le rouleau, ramenez le pied vers le nez et décollez le talon du lit (ne pas laisser ce rouleau en place après l'exercice).



➤ **Abduction hanche**

Pré-admission     Post-opératoire

Couché sur le dos sans tourner la jambe. Contractez bien la cuisse, tirez le pied vers vous et tentez d'écarter la jambe vers l'extérieur en la glissant sur le matelas. Vous pouvez progresser l'exercice en mettant une main sur la face externe de la cuisse, poussez la cuisse dans la main.



➤ **Renforcement fessiers**

Pré-admission     Post-opératoire

Couché sur le dos, serrez les fesses ensemble.

➤ **"Leg press"**

Pré-admission     Post-opératoire

Couché sur le dos :

1. Le genou opéré plié, passez une serviette ou un élastique sous votre pied en tenant les deux bouts avec vos mains.
2. Dépliez votre genou pour allonger votre jambe en créant une résistance avec la serviette ou l'élastique.
3. Repliez lentement la jambe sans laisser l'élastique vous ramener.



## EXERCICES FAITS ASSIS SUR UNE CHAISE

Dos appuyé au fauteuil, pieds appuyés au sol

### ➤ Flexion plantaire

Pré-admission     Post-opératoire

Soulevez les talons en gardant le bout des pieds au sol.



### ➤ Flexion dorsale

Pré-admission     Post-opératoire

Soulevez le devant des pieds en gardant les talons au sol.

### ➤ Flexion genou

Pré-admission     Post-opératoire

Pliez le genou au maximum. Au besoin, s'aider de l'autre jambe pour aller plus loin, ne pas décoller la fesse de la chaise. (N.B. Vous pouvez utiliser une chaise berçante pour aider à faire plier le genou ou une serviette au sol pour faciliter le glissement.)



### ➤ Extension genou

Pré-admission     Post-opératoire

En contractant les muscles de la cuisse, étendez le genou, tirez le pied vers le nez (ne pas soulever la cuisse)

### ➤ Renforcement cuisse

Pré-admission     Post-opératoire

Glissez le pied au sol pour étendre le genou en poussant le talon dans le plancher.



### ➤ Renforcement abducteurs

Pré-admission     Post-opératoire

Mettez vos mains sur la face externe des cuisses, poussez les cuisses dans les mains (vers l'extérieur).



### ➤ Renforcement des muscles « haut du corps »

Pré-admission     Post-opératoire

Poussez les mains sur les appuis-bras pour soulever les fesses de la chaise.



## EXERCICES FAITS EN POSITION DEBOUT

Debout avec appui des mains sur la marchette ou appuyé sur un meuble

### ➤ Piétinez sur place

- Pré-admission     Post-opérateur

Progresser en soulevant les genoux en alternance et marchez sur place.

### ➤ Mise en charge égale

- Pré-admission     Post-opérateur

Tenez-vous sur les 2 jambes, dos et genoux bien droits, poids égal sur les 2 pieds et essayez de ne pas prendre appui sur les mains.



### ➤ Extension terminale genou : jambe opérée en arrière

- Poussez bien le genou de votre jambe opérée vers l'arrière en contractant le muscle de votre cuisse.

- Pré-admission     Post-opérateur

- Dos au mur avec un rouleau derrière le genou opéré, écrasez le rouleau avec le genou. Tenez \_\_\_\_\_ secondes. Relâchez.


- Pré-admission     Post-opérateur



### ➤ Mini-squat et extension terminale

- Pré-admission     Post-opérateur

1. Alignez votre rotule vers le 2<sup>e</sup> orteil.
2. Pliez les genoux jusqu'à ce que vous sentiez les cuisses travailler. Les genoux ne doivent pas dépasser le bout des pieds.
3. Tenez la position \_\_\_\_\_ secondes.
4. Dépliez les genoux en essayant de les ramener le plus droit possible.
5. Tenez la position \_\_\_\_\_ secondes.



### ➤ Renforcement mollets

- Pré-admission     Post-opérateur

Montez sur la pointe des pieds et descendez.



### ➤ Flexion genou debout

- Pré-admission     Post-opérateur

Pliez votre genou du côté opéré le plus possible sans fléchir le dos ni plier la hanche.



### ➤ Flexion hanche debout

- Pré-admission     Post-opérateur

Pliez votre genou du côté opéré en pliant la hanche sans bouger le dos.



## GLACE OU CHALEUR <sup>26 27 28</sup>

- En phase aiguë et en phase de réadaptation, les applications de glace sont conseillées. Elles peuvent cependant être poursuivies plus longtemps si vous en tirez des bienfaits.

### Y A-T-IL DES PRÉCAUTIONS ET DES CONTRE-INDICATIONS CONCERNANT LA GLACE ET LA CHALEUR?

- N'appliquez jamais de **glace** ou de **chaleur** dans les cas suivants : problème circulatoire sévère; diminution importante de la sensibilité; prise de médicament affectant l'état de conscience; tumeur maligne (cancer); pendant le sommeil.
- N'appliquez jamais de **glace** dans les cas suivants : anémie, maladie de Raynaud, blessure ouverte importante, inconfort marqué au froid, urticaire au froid, hypertension sévère, diabète avec complications circulatoires.
- N'appliquez jamais de **chaleur** dans les cas suivants : hémorragie, stade aigu d'inflammation, infection, plaie ouverte, abcès, maladie de la peau (eczéma), allergie à la chaleur.
- Pour vérifier si vous avez une réaction allergique au froid ou au chaud, faites-en l'application ailleurs qu'au site de douleur pendant 3 minutes. Si la peau est rouge, c'est une réaction normale. Si la rougeur s'accompagne de boursouffure, l'utilisation de la glace ou de la chaleur est déconseillée.
- Différentes options s'offrent à vous pour appliquer la glace; nous vous conseillons la serviette de glace.

### SERVIETTE DE GLACE

- Enveloppez avec une serviette soit un sac de glace concassée ou un sac de petits légumes congelés et appliquez sur la région à traiter pendant 20 minutes, sans mouiller votre plaie chirurgicale. À la fin, il est normal que la région traitée soit rouge. Surveillez bien votre peau pour déceler tout signe de brûlure; cessez l'utilisation de la glace si cela se produit.
- La glace peut être appliquée plusieurs fois par jour. Attendez au moins 2 à 3 heures entre les applications de glace.
- Vous pouvez utiliser les coussins remplis de gel ou les enveloppements thermiques qui, par réaction chimique, deviennent très froids en recouvrant le sachet d'une serviette humide.

### CHALEUR

- Avant d'utiliser la chaleur, il faut s'assurer que la plaie est bien refermée et cicatrisée et que vous avez retrouvé la sensation du toucher sur la peau au pourtour de la cicatrice (au moins 3 semaines après la chirurgie).
- Utilisez une des modalités suivantes : sac magique, coussin rempli de gel, enveloppement thermique, coussin électrique. Appliquer sur la région à traiter pendant 20 minutes.
- Attendez au moins 2 à 3 heures entre les applications de chaleur.
- Attention de ne pas vous endormir avec un enveloppement chaud ou un coussin électrique.

---

<sup>26</sup> [http://www.readap.umontreal.ca/formation\\_physio/electrologic/modalites/modalites\\_physiques/cryotherapie.htm](http://www.readap.umontreal.ca/formation_physio/electrologic/modalites/modalites_physiques/cryotherapie.htm)

<sup>27</sup> <http://www.oppq.qc.ca/docs/sos.pdf>

<sup>28</sup> Brosseau L, Yonge K, Welch V, Marchand S, Judd M, Wells GA, Tugwell P. Thermotherapy for treatment of osteoarthritis (review). Cochrane Collaboration. 2003



## MASSAGE DE LA CICATRICE <sup>29</sup>

- Initialement, l'incision (la coupure) est légèrement chaude, rouge, enflée, sensible ou inégale.
- Il est normal de ressentir des démangeaisons ou des engourdissements.
- Une fois guérie, votre cicatrice devrait devenir mobile et souple pour permettre les mouvements complets de l'articulation.
- Dès que les points sont retirés et que **la cicatrice est exempte de « croûtes » ou d'écoulement** (vers la 3<sup>e</sup> semaine), vous pouvez commencer à masser les tissus au pourtour de la chirurgie (sauf si vous avez eu une greffe de peau).


### LE « MASSAGE » DE LA CICATRICE A PLUSIEURS FONCTIONS IMPORTANTES

- Modelez la cicatrice (ce qui l'aide à rester plate).
- Encouragez la production appropriée de collagène.
- Aidez à diminuer les démangeaisons et les douleurs.
- Donnez de la souplesse à la cicatrice.



Pour faire le massage, vous pouvez utiliser **selon l'avis de votre médecin**, en petite quantité, une crème émoullissante non parfumée ou de la vitamine E en huile. Placez la pulpe de vos index de chaque côté de la cicatrice, puis appuyez fermement mais confortablement sur les tissus pour que vos doigts et votre peau bougent ensemble : les doigts ne doivent pas glisser sur votre peau ou sur la cicatrice. Pour bien étirer votre cicatrice et les tissus environnants dans toutes les directions, faites 10 fois chacun des mouvements suivants, 2 fois par jour. Glissez vos doigts et votre peau :

- Verticalement : vers le haut et le bas.
- Horizontalement : vers la droite et la gauche.
- En décrivant de petits cercles dans les deux sens.



Ensuite, placez la pulpe de vos index et de vos pouces de chaque côté de la cicatrice, appuyez fermement mais confortablement sur les tissus pour que vos doigts et votre peau bougent ensemble :

- Pincez doucement la peau pour faire un bourrelet; cela soulève légèrement la peau pour la décoller de l'os ou du muscle.
- Essayez de faire rouler ce bourrelet vers le haut puis vers le bas (les extrémités de la cicatrice).

Les premières journées de ces massages, il est normal que la cicatrice réagisse un peu en enflant légèrement ou en devenant un peu plus chaude. Si cela vous incommode, vous pouvez appliquer de la glace pendant 20 minutes sur votre cicatrice après les sessions de massage.

Continuez le massage aussi longtemps qu'il le faut pour que la cicatrice soit aussi souple que les tissus normaux qui l'entourent. Cessez le massage si des douleurs se développent ou si votre cicatrice ne réagit pas bien : rougeur, ↑ chaleur, écoulement, épaissement...

### AUTRES PRÉCAUTIONS

Protégez votre cicatrice du soleil en utilisant une crème de protection solaire d'indice maximal.

# ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE À L'HÔPITAL ET LORS DU RETOUR À DOMICILE

Pour réaliser vos activités de la vie quotidienne (vous laver, vous habiller, etc.) vous utilisez des façons de faire qui vous sont habituelles et donc automatiques. À la suite de votre chirurgie, à cause de restrictions post opératoires, (limitation au niveau de la flexion du genou opéré), il est possible que vous deviez, dans différentes situations, **modifier vos habitudes de vie** parce que certains mouvements seront plus difficiles à réaliser pendant quelque temps.

Dès le lendemain de votre chirurgie, vous vous lèverez et vous assoirez au fauteuil avec l'aide du personnel soignant. Des précautions sont à prendre, c'est pourquoi les positions au lit, les techniques de transfert et la bonne façon d'utiliser la marchette vous sont enseignées telles que visionnées dans le DVD. Nous vous suggérons de vous munir **de pantoufles qui recouvrent bien tout le pied et qui ont un talon plat (maximum 1½ pouce)**. N'apportez pas de mules. Voir la liste d'équipements recommandés (page 75).

## POSITIONS AU LIT

### À ÉVITER :

Vous devrez éviter de mettre un oreiller sous votre genou opéré (normalement 6 à 8 semaines après la chirurgie).

- Le positionnement sur le côté n'est pas contre-indiqué, mais sera sans doute plus supportable si vous vous allongez sur le côté non-opéré. Placez un oreiller entre les jambes pour maintenir l'alignement et améliorer votre confort.

## POUR VOUS LEVER DU LIT

- Assoyez-vous lentement en vous aidant de vos avant-bras et coudes, puis de vos mains.
- Pivotez sur les fesses pour sortir les jambes sur le côté du lit. Vous pouvez placer le membre inférieur non opéré sous la jambe opérée pour supporter celle-ci jusqu'au moment où vous serez capable de soulever votre jambe opérée sans aide.
- Glissez-vous lentement sur le bord du lit jusqu'à ce que le pied de la jambe saine puisse prendre appui au sol et avancer le pied de la jambe opérée.
- La marchette étant bien en place devant vous, **levez-vous en vous poussant du lit avec les mains**.
- Ne portez les mains à la marchette qu'une fois bien redressé.



## POUR VOUS COUCHER

- Assoyez-vous sur le bord du lit.
- Reculez les fesses le plus possible.
- Pivotez sur les fesses pour remonter les jambes. Vous pouvez placer le membre inférieur non opéré sous la jambe opérée pour supporter celle-ci.
- Descendez sur le dos lentement en utilisant vos mains, coudes et avant-bras.

## POUR VOUS ASSEoir

Il est nécessaire d'utiliser une chaise de bonne hauteur avec appui-bras (type chaise de cuisine, assise plus haute que le pli arrière du genou).

- Pour vous diriger vers le fauteuil, faites plutôt de petits pas en tournant et en soulevant chacun de vos pieds.
- Reculez jusqu'à ce que vous sentiez la chaise derrière vos genoux.
- Étendez la jambe opérée vers l'avant en gardant le genou légèrement plié (pour les premiers jours).
- Placez vos mains sur les appuis-bras de la chaise, une à la fois.
- Assoyez-vous lentement en prenant appui sur vos mains. Évitez de vous laissez tomber.



## POUR VOUS RELEVER

- Approchez les fesses près du bord de la chaise (ou du siège de toilette muni d'appuis-bras, s'il n'y a pas de barres au mur).
- Étendez la jambe opérée vers l'avant (pour les premiers jours).
- Placez vos mains sur les appuis-bras et soulevez-vous lentement sans vous donner d'élan. **Ne tentez jamais de vous lever en tirant sur la marchette**, celle-ci n'étant pas fixée au sol, vous retomberiez vers l'arrière.
- Dès que vous êtes bien en équilibre sur la bonne jambe, placez une main sur la marchette pour vous aider à vous relever complètement.

## EN POSITION ASSISE

Vous pouvez déposer votre jambe opérée sur un petit banc, durant de courtes périodes. Au besoin, vous pouvez surélever la surface du siège avec un coussin pour faciliter le lever. Il est important de varier vos positions.



## POUR LES TOILETTES

Lors de votre hospitalisation, vous utiliserez une chaise d'aisance qui sera placée près du lit les premiers jours. Par la suite, vous vous rendrez à la salle de bain. Les techniques de transfert sont les mêmes que pour vous asseoir ou vous relever d'une chaise.



## LA MARCHÉ

Vous devrez utiliser une marchette tout au long de votre séjour hospitalier. Celle-ci vous est prêtée tant que vous serez hospitalisé. Pour votre réadaptation à domicile, vous devez faire les démarches pour en faire la location ou l'achat (voir fournisseurs page 79).

La marchette sécurisera vos déplacements et vous permettra de ne mettre que la mise en charge permise par le chirurgien sur votre jambe opérée. Le pourcentage de mise en charge sera noté à votre dossier à la suite de la chirurgie et vous serez informés lorsque l'on procédera à votre premier lever. Ceci pourra modifier légèrement la façon d'utiliser la marchette. Vous pourrez circuler avec votre marchette sans surveillance dès que votre professionnel de la physiothérapie l'autorisera.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA MARCHETTE OU DE LA CANNE OU DES BÉQUILLES

L'ajustement de la marchette, de la canne ou des béquilles se fait debout en se tenant droit, avec des souliers à talons plats, pieds légèrement écartés.

- Placez-vous debout entre les deux côtés de la marchette ou placez le sabot (bas) de la canne ou de la béquille à environ 15 cm (6 po) des pieds.

Pour ajuster la hauteur des appuis-mains :

- Laissez tomber le bras le long de la marchette, de la canne ou de la béquille et assurez-vous que **l'appui-main arrive au niveau du pli du poignet.**

Prendre note que pour les béquilles :

- La hauteur doit permettre de placer deux (2) doigts entre le haut de la béquille et l'aisselle (épaules relâchées).



### COMMENT MARCHER AVEC VOTRE MARCHETTE

- Avancez la marchette.
- Avancez la jambe opérée en allongeant le genou au maximum. Déposez le talon au sol en premier.
- Appuyez-vous sur la marchette lorsque vous avancez la jambe saine (vous pourrez faire la mise en charge sur la jambe opérée selon la prescription de l'orthopédiste).
- Évitez de tourner de 90° avec la marchette en une seule étape. Faites de petits pas pour tourner.



# COMMENT MARCHER AVEC VOS BÉQUILLES OU VOTRE CANNE

## AVEC BÉQUILLES

- Avancez les béquilles.
- Avancez la jambe opérée en allongeant le genou au maximum.
- Appuyez-vous sur les béquilles et avancer l'autre jambe. Appuyez-vous sur la jambe opérée selon les indications de l'orthopédiste. Votre professionnel de la physiothérapie vous donnera les consignes.

## AVEC CANNE

- Prenez la canne du **côté opposé** à la jambe opérée lorsque l'appui complet est permis.
- Avancez la canne.
- Avancez la jambe opérée.
- Puis avancez l'autre jambe.
- Lorsque vous serez habitué, la canne et la jambe opérée peuvent être avancées en même temps.
- Quelle que soit l'aide à la marche utilisée, évitez de boiter.
- La marche naturelle, sans soutien, pourra commencer lorsque la boiterie et la douleur auront disparu.



## LES ESCALIERS

Monter ou descendre un escalier est possible après une chirurgie comme la vôtre, à condition de respecter certaines règles de base tant que vous aurez de la douleur ou de la faiblesse.

### COMMENT MONTER UN ESCALIER?

- Utilisez toujours 2 appuis : 1 main courante et 1 aide technique (cane/béquille) ou 2 mains courantes.
- Approchez la canne ou les béquilles près de la marche; poussez sur les appuis et transférez votre poids sur votre jambe opérée selon tolérance; **montez la jambe saine en premier sur la marche**; montez la canne ou les béquilles et la jambe opérée simultanément sur la même marche en vous supportant avec vos mains; répétez cette séquence de mouvements à chacune des marches à monter : jambe saine, canne (ou béquilles) avec jambe opérée sur la même marche; jambe saine ...



### COMMENT DESCENDRE UN ESCALIER?

- Au départ, la canne ou les béquilles et les 2 jambes sont sur la même marche; **descendez la canne ou les béquilles et la jambe opérée en premier** en vous appuyant sur vos mains; descendez la jambe saine sur la même marche que la jambe opérée; répétez cette séquence de mouvements à chacune des marches à descendre : canne (ou béquilles) avec la jambe opérée puis jambe saine sur la même marche; canne et jambe opérée...



Votre professionnel de la physiothérapie vous fera une démonstration et vous accompagnera lors de vos premières tentatives dans les escaliers. **Ne vous y aventurez pas seul. N'utilisez jamais une marchette dans les escaliers.**

## TRANSFERT AU BAIN

Après la chirurgie, vous ne devez pas vous asseoir au fond du bain, car vous pourriez avoir de la difficulté à vous relever, d'autant plus que vous risquez de faire des mouvements contre-indiqués.

La méthode préconisée est l'utilisation d'un banc de transfert de bain, comme suit :

1. Avancez jusqu'au bain.
2. Mettez une serviette sur le banc de bain afin de glisser plus facilement.
3. Faites demi-tour pour être dos au bain.
4. Étendez votre jambe opérée en gardant le genou légèrement plié.
5. Assoyez-vous en appuyant une main sur le banc, en agrippant la poignée de sécurité ou la barre d'appui. Vous pouvez appuyer l'autre main sur le banc aussi ou la garder sur la marchette.
6. Passez une jambe dans le bain, puis l'autre.
7. Une fois assis, tournez-vous lentement pour faire face aux robinets en vous assurant de maintenir un bon alignement de la jambe opérée.




Pour sortir, inversez la manœuvre.

## TRANSFERT À LA CABINE DE DOUCHE

Vous pouvez choisir de prendre votre douche debout ou en position assise. Vous devez simplement juger de vos forces et du niveau de douleur que vous éprouvez à ce moment de votre convalescence. Les points importants à respecter sont :

1. Avancez jusqu'à la douche avec votre marchette.
2. Entrez la jambe saine en premier.
3. Prenez appui sur la barre verticale (s'il y en a une), puis passez la jambe opérée.
4. Mettez une à une les mains sur le siège de douche (s'il y en a un) et vous asseoir.



## HYGIÈNE

Pour votre toilette personnelle, une mitaine de bain évite d'échapper le pain de savon. L'utilisation d'une éponge à long manche permet de rejoindre les endroits plus difficiles comme le dos, les jambes et les pieds et diminue les risques de chute. Une douche téléphone permet de rester assis pendant votre douche, ce qui diminue les risques de chute. L'ajout de barres d'appui au mur confère un élément de sécurité lors de vos transferts au bain. Pour vous sécher, enroulez une serviette sur l'éponge à long manche ou une pince à long manche.

## HABILLAGE

Il est préférable d'effectuer cette activité assis au bord du lit ou sur une chaise. Normalement, cette activité présente peu de difficulté. Par contre, si votre genou ne plie pas adéquatement, la grande difficulté des gens qui ont été opérés est d'enfiler les pantalons, les sous-vêtements, les bas et les souliers. Utilisez les aides techniques recommandées dans la liste d'équipements (page 75). Celles-ci sont facultatives. Vous pouvez aussi demander l'aide de votre accompagnateur jusqu'à ce que vous puissiez plier adéquatement votre genou.

## LES BAS

L'enfile-bas est un outil vous permettant d'enfiler les bas. Le bâton d'habillage ou la pince à long manche sont utiles pour les enlever.



## LES CHAUSSURES

Voir la liste d'équipements recommandés (page 75). Un chausse-pied (cuillère) à long manche peut faciliter l'entrée et la sortie du pied de la chaussure. Les lacets de vos chaussures peuvent être remplacés par des lacets élastiques, car vous pourriez avoir de la difficulté à vous pencher pour les lacer. Vous pouvez aussi porter des chaussures à velcro et utiliser la pince à long manche ou le bâton d'habillage pour refermer l'ouverture.



## LES PANTALONS ET LES SOUS-VÊTEMENTS

Ils s'enfilent ou s'enlèvent au moyen du bâton d'habillage ou de la pince à long manche, selon votre préférence. **Glisser la jambe opérée en premier**, puis l'autre jambe, et tirer le vêtement vers vous. Pour l'enfiler jusqu'à la taille, vous lever en vous appuyant sur l'appui-bras de la chaise. Appuyer une main au centre de la marchette pendant que l'autre main remonte le vêtement.



# ACTIVITÉS DE LA VIE DOMESTIQUE LORS DU RETOUR À DOMICILE

## TACHES MÉNAGÈRES

Assurez-vous de faire le plus de tâches possibles par vous-même tout en prenant des pauses fréquemment afin d'accélérer votre réadaptation tout en économisant votre énergie. Assoyez-vous pour exécuter certaines tâches comme : préparer les repas, repasser, bricoler.

Pour les 6 premières semaines, évitez de procéder à des travaux ménagers lourds comme : grand ménage, lavage de planchers et de fenêtres, tonte de la pelouse, déneigement. Faites votre lessive par étapes de façon à transporter et gérer de petites quantités de linge.

## TRANSPORT DE CHARGES

Pour transporter des objets, vous pouvez utiliser un tablier avec des poches, un sac attaché à votre marchette (évitez la surcharge) ou un sac à dos. Vous pouvez utiliser une table à roulettes ou une chaise à roulettes pour transporter un plus grand nombre d'objets. Dans vos placards, vous devriez ranger les objets les plus utilisés sur les tablettes faciles d'accès (du niveau des épaules jusqu'au niveau des cuisses).

**Éviter de transporter des objets dans vos mains lorsque vous vous déplacez avec une marchette ou une canne. Si vous devez malgré tout le faire ou si vous marchez sans canne, portez la charge dans la main du même côté que votre chirurgie.**



Sachez que si la préparation des repas ou l'entretien ménager deviennent de véritables casse-tête, des organismes communautaires peuvent vous venir en aide à faible coût (voir la liste des ressources (page 79).


## ATTEINDRE UN OBJET HORS DE PORTÉE

N'utilisez jamais d'escabeau ou de chaise pour atteindre des objets placés plus haut que le niveau des épaules.

Pour atteindre un objet au sol ou des objets placés plus bas que le niveau des genoux, utilisez une pince à long manche.



Lorsque vous serez plus fort, vous pourrez vous appuyer sur une surface solide (ex. : un comptoir) et ramasser l'objet par terre en étendant la jambe opérée derrière vous. Plus tard, lorsque vos jambes seront plus fortes, vous pourrez prendre des objets au sol en pliant vos hanches et vos genoux sans aller trop bas pour pouvoir remonter (pour plus de sécurité, vous pourriez prendre appui à une table ou à un comptoir). Attention de ne pas trop solliciter votre dos.



## LA SEXUALITÉ

Vous pourrez reprendre vos activités dès que vous vous sentirez mieux. Jusqu'à ce que la guérison soit complète, nous vous conseillons de vous placer dans une position confortable en respectant les consignes sur les mouvements contre-indiqués, si vous en avez. Évitez de vous mettre à genoux sur le côté opéré.

## CONDUITE AUTOMOBILE

- Le temps d'attente requis avant de conduire votre véhicule après votre opération dépend de plusieurs facteurs : Quelle jambe a été opérée? De quelle sorte de transmission votre voiture est-elle pourvue? Quel est votre état de santé général depuis la chirurgie? Donc, il est préférable de consulter votre chirurgien avant de reprendre cette activité.
- Pendant votre convalescence, même comme passager, les longs voyages ne sont pas recommandés.

La Société de l'assurance automobile du Québec<sup>30</sup> (SAAQ) indique dans ses documents que, pour conduire de façon sécuritaire, une personne doit « pouvoir tourner le volant sur toute son amplitude et faire fonctionner les commandes du véhicule avec aisance, rapidité et précision, notamment en cas d'urgence et simultanément lorsque requis.

### TRANSFERT À L'AUTO (BANQUETTE AVANT)

Effectuez vos transferts à l'auto.

1. Placez-vous sur le pavé, et non sur le trottoir.
2. Assurez-vous que quelqu'un a ajusté le siège de la voiture aussi loin que possible vers l'arrière et a abaissé le dossier du siège avant que vous y montiez.
3. Recouvrez l'assise du siège de la voiture d'un sac de plastique afin de rendre la surface plus glissante (facilite le transfert).
4. Approchez-vous du siège, dos à l'auto, avec votre marchette, placez une main sur le dossier du siège et l'autre sur la fenêtre baissée ou sur l'assise du siège (jamais sur la porte du véhicule).
5. Assoyez-vous sur le siège et glissez-vous jusqu'à ce que vos genoux soient bien soutenus par le siège.
6. Entrez vos jambes une à la fois dans la voiture, en prenant soin de maintenir un bon alignement de la jambe opérée.
7. Une fois la jambe opérée entrée, vous pouvez réajuster la position du dossier et du siège pour votre confort.

Procédez à l'inverse pour descendre de voiture en commençant par abaisser le dossier du siège et reculer le siège.



<sup>30</sup> Guide de l'évaluation médicale et optométrique des conducteurs au Québec, Édition révisée 1999, Société de l'assurance automobile, ISBN 2-550-29251-0

## LISTE D'ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

Plusieurs aides techniques peuvent vous faciliter la vie. Lors de la rencontre de groupe, l'ergothérapeute vous conseillera au besoin ceux qui sont les plus appropriés pour vous. Vous pourriez vous les procurer chez un fournisseur d'appareils orthopédiques (voir la liste à la fin de ce document) ou dans une pharmacie. La location d'équipement peut s'avérer avantageuse pour certains articles.

Cochez les équipements au fur et à mesure que vous les aurez acquis, idéalement avant votre séjour à l'Hôpital ou au plus tard le lendemain de votre hospitalisation (votre accompagnateur vous aidera à prendre les arrangements de location ou d'achat). Apportez à l'Hôpital l'item marqué d'un astérisque (\*), et vous assurer de bien l'identifier :

### POUR SE LAVER :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mitaine de bain ou éponge                             | <input type="checkbox"/> Poignée de sécurité de bain, barres d'appui murales      |
| <input type="checkbox"/> Savon liquide ou pain de savon muni d'une corde       | <input type="checkbox"/> Tapis antidérapant                                       |
| <input type="checkbox"/> Brosse ou éponge à long manche                        | <input type="checkbox"/> Douche téléphone avec commandes sur le pommeau de douche |
| <input type="checkbox"/> Banc de transfert, planche de bain ou siège de douche |   |

### POUR LA TOILETTE :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Siège surélevé pour la toilette, avec ou sans appui-bras :<br>2 pouces <input type="checkbox"/> 4 pouces <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Cadre de sécurité pour la toilette |
|  | <input type="checkbox"/> Chaise d'aisance (chaise commode)  |
|  | <input type="checkbox"/> Urinal                             |

### POUR MARCHER (SELON VOTRE CONDITION) :

- |                                |                                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Canne | <input type="checkbox"/> Béquilles | <input type="checkbox"/> Marchette standard ou à 2 roues |
|--------------------------------|------------------------------------|--|

### POUR S'HABILLER :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pince à long manche (26 po)  | <input type="checkbox"/> Enfile-bas        |
| <input type="checkbox"/> Chausse-pied (cuillère) à long manche  | <input type="checkbox"/> Lacets élastiques |
| <input type="checkbox"/> Bâton d'habillage  |  |
| <input type="checkbox"/> Chaussures à enfiler (« loafers ») ou à velcro, assez larges pour éviter la pression si les pieds sont enflés, à semelles antidérapantes et à talons plats (maximum 1 ½ pouce), qui absorbent les chocs et supportent l'arche plantaire* |  |

### POUR LES TRAVAUX DIVERS :

- Tabouret haut (24 pouces) pour s'asseoir lorsqu'on cuisine ou fait des travaux de précision
- Un petit conseil de votre ergothérapeute : votre santé passe avant tout et vous la prenez très certainement au sérieux, alors l'achat des équipements suggérés n'est absolument pas un luxe, mais une nécessité pour guérir de façon optimale!

### POUR VOS AUTOSOINS :

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sac de glace ou légumes congelés   | <input type="checkbox"/> Contenant rectangulaire pour pouvoir le transvider à la pharmacie (pour déposer les seringues et l'aiguille) |
| <input type="checkbox"/> Thermomètre  | <input type="checkbox"/> Analgésiques (ex : Tylenol®)   |
| <input type="checkbox"/> Tampons alcoolisés ou boules d'ouate avec une bouteille d'alcool isopropylique 70% |   |
| <input type="checkbox"/> Compresses, ruban adhésif médical  |   |

## PRÉVENTION DES CHUTES

Les chutes n'arrivent pas qu'aux autres. Après votre chirurgie, votre équilibre étant peut-être moins bon, il sera d'autant plus important de mettre toutes les chances de votre côté afin d'éviter les chutes et leurs conséquences fâcheuses.

- Dégagez les espaces de circulation en enlevant tous les obstacles sur les planchers, dans les couloirs et dans les escaliers.
- Prenez votre temps dans les escaliers et utilisez les mains courantes aussi longtemps que nécessaire. Autant que possible, ne transportez pas de charges dans les escaliers.
- Installez des tapis antidérapants, particulièrement dans les endroits mouillés comme dans le bain et la douche.
- Dans la douche, utilisez un savon liquide ou un savon en pain muni d'une corde.
- Assurez-vous que l'éclairage est suffisant même la nuit : lampe de chevet facile à atteindre, veilleuses...
- Réaménagez les meubles afin de circuler librement avec votre marchette, votre canne ou vos béquilles.
- Soyez prudent dans vos déplacements lorsque vous êtes sous l'effet des médicaments.
- Relevez-vous lentement de la position assise ou couchée.
- Demandez de l'aide pour atteindre des objets placés haut, lourds ou difficiles à manœuvrer. Placez les objets les plus utilisés à une hauteur facile à atteindre sans monter sur un banc ou sur une chaise.
- Gardez votre téléphone sans fil près de vous en cas d'incident. Pour les personnes vivant seules, il existe des systèmes plus sophistiqués d'alerte personnelle, mais aussi plus coûteux. Parlez-en à votre ergothérapeute. Ne vous dépêchez pas pour aller répondre au téléphone. Gardez les numéros d'urgence près de vous et dans un format facile à lire.
- À l'intérieur, portez des chaussures ou des pantoufles antidérapantes. À l'extérieur, portez des chaussures ou des bottes antidérapantes. En hiver, vous pouvez porter sous vos bottes une semelle spéciale munie de pointes métalliques. Ne marchez pas sur de la pelouse mouillée.
- Ne portez pas de vêtements trop longs. Utilisez une ceinture si nécessaire.
- Placez vos animaux de compagnie chez une personne de confiance si vous craignez qu'ils vous occasionnent des chutes. Sinon, les munir d'un collier avec une clochette pour être informé de leur présence. Ne laissez pas leurs jouets encombrer le sol.
- Ne transportez pas trop de paquets, utilisez plutôt les services de livraison ou les chariots de transport.
- Si vous avez fait des chutes dans le passé, tentez d'en déterminer la cause afin de prévenir une nouvelle chute.
- Soyez conscient de vos limites et respectez-les.

## MÉTHODE DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES

- Avant de commencer une activité, arrêtez-vous et demandez-vous :
  1. Est-ce que je fais un mouvement à risque?
  2. Si la réponse est non, vous pouvez effectuer la tâche en respectant votre douleur et votre seuil de tolérance.
  3. Si la réponse est oui, changez votre technique, utilisez l'équipement adapté suggéré, demandez de l'aide ou n'effectuez tout simplement pas la tâche.
- Avant d'entamer un projet, assurez-vous d'avoir suffisamment d'énergie pour accomplir complètement l'activité ou prévoyez des temps de repos.
- Quelquefois, il est nécessaire d'organiser son environnement. Par exemple : l'endroit où vous vous assoirez, les objets que vous utiliserez, etc.
- Des méthodes précises pour atteindre les objets trop hauts ou trop bas vous seront enseignées par votre thérapeute. Parfois, une pince à long manche peut s'avérer fort pratique!

## RESSOURCES

Plusieurs sites Web vous offrent de l'information sur votre chirurgie, sur votre pathologie ou encore sur la vie avec une prothèse. Nous en avons listé quelques-uns pour vous :

[www.coa-aco.org](http://www.coa-aco.org)

<http://www.canorth.org/fr>

[www.myjointreplacement.ca](http://www.myjointreplacement.ca)

[www.santémontérégie.qc.ca](http://www.santémontérégie.qc.ca)

[www.arthrite.ca](http://www.arthrite.ca)

Lien internet pour visualiser les différents documents « Pas à pas » et vidéos d'exercices et de conseils :

[www.prothesehanche-genou.ca](http://www.prothesehanche-genou.ca) (site Internet du CISSS de la Montérégie-Centre)

## LA CONVALESCENCE APRÈS UNE CHIRURGIE OU UNE HOSPITALISATION

Pour trouver un milieu de convalescence en résidence pour personnes âgées, vous pouvez vous référer :

- À la rubrique « Résidences pour personnes retraitées » des pages jaunes du bottin de téléphone.
- Au site Internet du Ministère de la Santé et des Services sociaux :  
<http://www.msss.gouv.qc.ca/répertoires/index.php>
  1. Aller dans la section « personnes âgées » se trouvant au bas de la page;
  2. Cliquer sur « Registre des résidences pour personnes âgées »;
  3. À partir des menus déroulants, choisir une région socio sanitaire et un territoire de CLSC;
  4. Lancer la recherche (bouton bleu).

N. B. : Prenez note que des frais sont associés à l'hébergement en milieu de convalescence.

## LISTE DES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS

ENDROITS OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L'ÉQUIPEMENT ADAPTÉ POUR VOUS AIDER DANS VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (HABILLAGE, HYGIÈNE, ALIMENTATION, DÉPLACEMENTS, ETC.) :

NOM	OÙ LES TROUVER	SPÉCIALISATION(S)
<b><u>Oxybec Médical</u></b> (à côté de l'œuf Doré)	917, Boul. Du Séminaire Nord St-Jean-Sur-Richelieu, J3A 1B8 Tél : 450-349-1128 Fax : 450-349-1158 Site web : <a href="http://www.oxybec.com">www.oxybec.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vente et location</li> <li>✓ Équipement adapté pour le domicile (fauteuils roulants, pinces à long manche, coussins, cannes, etc.)</li> </ul>
<b><u>Estrie Roule</u></b>	242, Robinson sud Granby, J2G 7M6 Tél : 450-777-0111 Fax : 450-777-4423 Site web : <a href="http://www.estrieroule.com">www.estrieroule.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vente, location et réparation</li> <li>✓ Aides à la mobilité (fauteuils roulants, béquilles, cannes, marchettes, etc.)</li> <li>✓ Hygiène et soins personnels</li> </ul>
<b><u>Équipement Adapté M.C.L.</u></b>	275, boul. Curé-Poirier Ouest Longueuil, J4J 2G4 Tél : 450-442-4111	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vente, location, réparation, installation</li> <li>✓ Équipement adapté pour le domicile (fauteuils roulants, pinces à long manche, coussins, cannes, etc.)</li> </ul>
<b><u>Création Confort</u></b>	45-B, rue Green (3 <sup>e</sup> étage) St-Lambert, J4P 1S2 Tél : 450-672-8976 Site web : <a href="http://www.creationconfort.com">www.creationconfort.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vêtements adaptés (s'attachent avec des boutons pression)</li> <li>✓ Commande sur place ou livraison</li> <li>✓ Service spécialisé de conseillers</li> </ul>
<b><u>Médecus</u></b>	8000, boul. Leduc Brossard Site web : <a href="http://www.medicus.ca">www.medicus.ca</a> Tél : 450-443-3666	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vente, location, réparation, installation</li> <li>✓ Service personnalisé</li> <li>✓ Équipement adapté pour le domicile (fauteuils roulants, pinces à long manche, coussins, cannes, etc.)</li> </ul>
<b><u>Confection Aline</u></b>	844, rue Honoré-Mercier St-Jean (secteur Iberville) Tél : 450-347-3285	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vêtements adaptés</li> <li>✓ Vente d'articles de Création Confort</li> </ul>
<b><u>Aide aux Personnes Obèses Handicapées du Québec (centre de distribution d'aides techniques)</u></b>	12 716, boul. Industriel Montréal, H1A 3V2 Tél : 514-254-8415 Fax : 514-256-6627	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Équipement spécialisé aux hôpitaux et personnes référées par CLSC.</li> <li>✓ Pour personnes de 300 lbs et plus.</li> </ul>
<b><u>Eureka Solutions</u></b>	7781, boul. Newman Ville LaSalle, H8N 1X7 Tél : 1-866-562-2555 Site web : <a href="http://www.eurekasolution.com">www.eurekasolution.com</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite</li> <li>✓ Installation de rampes pour maisons</li> <li>✓ Reconnu par la SAAQ, Transports Québec et la CSST</li> </ul>
<b><u>Les distributions Equimed</u></b>	1727-5, boul. Périgny Chambly Tél : 450-447-9816 Site web : <a href="http://www.equimed.ca">www.equimed.ca</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vente, location, réparation, installation</li> <li>✓ Service personnalisé</li> <li>✓ Équipement adapté pour le domicile (fauteuils roulants, pinces à long manche, coussins, cannes, etc.)</li> </ul>

**Note :** Vous pouvez aussi trouver de l'équipement adapté dans certains **magasins à grande surface et pharmacies**. Cependant, les boutiques spécialisées offrent généralement un plus grand choix d'aides techniques ainsi qu'un service de conseillers pouvant vous guider dans vos choix.

## FOURNISSEURS / RESSOURCES

**CLSC Vallée des forts** 450-358-2578  
Infirmière soutien à domicile poste 2311  
Infirmière services ambulatoire poste 2517  
Réadaptation poste 2111

**CLSC Richelieu** 450-658-7561  
Infirmière et réadaptation soutien à domicile poste 4176  
Infirmière services ambulatoires poste 4900

**Info Santé** 811

**Centre de services ambulatoires et unité de médecine familiale (UMF)** 450-359-5000  
Clinique externe de physiothérapie poste #5178  
RFI externe poste #8697  
1225 Douglas  
St-Jean-sur-Richelieu  
J2W 0J2

**Centre d'hébergement et de soins de longue durée Sainte-Croix** 450-359-5000  
RFI externe poste #8104  
300 Rue du Docteur Poulin  
Marieville  
J3M 1L7

### AIDE À DOMICILE

**Mobil'Aide** 450-346-1011  
55, 5<sup>e</sup> avenue, St-Jean-sur-Richelieu [www.mobilaide.com](http://www.mobilaide.com)

**Aide à tout** 450-446-2108  
2306, boul. Industriel, Chambly [www.aideatout.com](http://www.aideatout.com)

**Service d'aide domestique Jardins-Roussillon** 450-619-0817  
260, rue St-Pierre, St-Constant

### Centres d'action bénévole (transport et autre)

**CAB St-Jean-sur-Richelieu** 450-347-7527

**CAB Iberville** 450-347-1172

<b>CAB Clarenceville</b>	450-294-2646
<b>CAB Marieville et Richelieu</b>	450-460-2825
<b>CAB Chambly</b>	450-658-4325 450-658-1568
<b>CAB Saint-Césaire</b>	450-469-3279

## ALIMENTATION

### Site Internet de votre épicerie préférée

Pour commander et pour organiser la livraison. [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____)

Dans certains cas, possibilité de commande téléphonique.

<b>Popotte roulante</b> (CAB St-Jean-sur-Richelieu)	450-347-7527
<b>Voiles au vent</b> (Halles de St-Jean)	450-349-0333
<b>En passant (comptoir santé)</b> 378, boul. St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu	450-349-1750
<b>Centre communautaire l'Entraide Plus</b> (Chambly)	450-658-4469
<b>À plat ventes</b> 950, boul. du Séminaire N, Saint-Jean sur Richelieu	450-446-2108 450-529-1219 <a href="http://www.aplatventes.com">www.aplatventes.com</a>



# VOTRE CARNET DE NOTES

## LORS DE LA VISITE DE PRÉ-ADMISSION

---

---

---

---

---

## LORS DE L'HOSPITALISATION

---

---

---

---

---

## LORS DU PREMIER RENDEZ-VOUS DE SUIVI AVEC L'ORTHOPÉDISTE

---

---

---

---

---

## LORS DES AUTRES RENDEZ-VOUS DE SUIVI AVEC L'ORTHOPÉDISTE

---

---

---

---

---

## VOS INTERVENANTS

- Orthopédistes : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Infirmières assistantes en chirurgie: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Infirmières : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Professionnels de la physiothérapie: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Ergothérapeute : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Travailleur social : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Nutritionniste : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- CLSC: \_\_\_\_\_
  - Infirmière : \_\_\_\_\_
  - Réadaptation: \_\_\_\_\_

Faites inscrire le nom des gens que vous rencontrez tout au long de votre continuum de soins, afin de pouvoir vous y référer au besoin.