

Biopsie rénale

Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

Si vous prenez:

■ de la *Warfarine*, également appelée *Coumadin*[®], *Xarelto* ou autres anti-coagulants:

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médicament que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

■ des antiplaquettaires, tel que le *Plavix*:

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

Le matin de l'examen

- ➔ Prendre un petit déjeuner léger.
- ➔ Vous devez vous présenter en médecine de jour (MDJ) au 1^{er} étage, à 7 h 30, avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.
- ➔ Vous devez être disponible toute la journée.
- ➔ Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.

Le déroulement de l'examen

LA BIOPSIE RÉNALE COMPREND 3 ÉTAPES PRINCIPALES:

- 1 Sous guidage échographique, anesthésie locale de la région du rein sélectionnée par le radiologiste.
- 2 Insertion de l'aiguille à biopsie jusqu'au site choisi, puis prélèvement de 2-3 spécimens pour analyses en laboratoire.
- 3 Retrait de l'aiguille à biopsie, compression du point de ponction.



Lorsque le mécanisme de l'aiguille se déclenche, celui-ci produit un son ressemblant à celui d'une agrafeuse.

Quel est le délai d'attente avant d'obtenir les résultats ?

Le délai d'attente pour les résultats de la biopsie rénale est d'environ deux semaines. C'est votre médecin qui vous les communiquera.

Y a-t-il des risques liés à la biopsie rénale ?

Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé :

- Un saignement et/ou un hématome au site de ponction.
- Une douleur au site de ponction.
- Une infection du site de ponction.

Retour à la maison

- Vous devez vous reposer 24 heures.
- Vous devez garder le pansement 24 heures. Vous ne devez pas le mouiller pour ne pas faciliter l'infection.
- Vous ne devez pas conduire pendant les 24 premières heures.
- Vous ne devez pas effectuer d'exercices physiques intenses dans les 48 heures suivant la biopsie.

Contactez-nous immédiatement au **450 468-8111 poste 86495** si :

- Si vous saignez abondamment au point de ponction (en cas de saignement actif, allongez-vous sur le ventre et demandez à quelqu'un d'appuyer sur le site de ponction).
- Si vous constatez un changement de couleur, de température ou un écoulement anormal au niveau de la zone de ponction.
- Si vous avez des douleurs lombaires ou abdominales prolongées qui vont en augmentant.
- Si vous avez de la fièvre ou des frissons dans les 24 heures suivant l'examen.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cissme



400-3553