

Gastrostomie / Gastrojéjunostomie

Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

Si vous prenez:

■ **de la Warfarine, également appelée Coumadin®, Xarelto ou autres anti-coagulants:**

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médication que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

■ **des antiplaquettaires, tel que le Plavix:**

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

Le matin de l'examen

VOUS DEVEZ ÊTRE À JEUN À PARTIR DE MINUIT.

➔ **Vous devez vous présenter au CDJ à 6 h 30 avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.**

➔ **Vous devez être disponible toute la journée.**

➔ **Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.**

Le déroulement de l'examen

LA GASTROSTOMIE OU LA GASTROJÉJUNOSTOMIE COMPRENENT **6** ÉTAPES PRINCIPALES

- 1 Installation d'un tube nasogastrique au CDJ.**
- 2 En salle d'angiographie: insufflation d'air dans l'estomac par le tube nasogastrique.**
- 3 Sous anesthésie locale, ponction de l'estomac et installation de points d'ancrage sous guidage radioscopique.**
- 4 Insertion d'un cathéter dans l'estomac afin d'opacifier (colorer) le tube digestif.**
- 5 Installation du tube à gastrostomie/ gastrojéjunostomie.**
- 6 Fixation du tube et installation d'un pansement.**

Quelle est la différence entre une gastrostomie et une gastrojéjunostomie ?

Dans le cas de troubles de la déglutition, un tube de gastrostomie sera installé. Il permet d'introduire les aliments directement dans l'estomac.

Quand la gastrostomie est impossible (ex : reflux gastro-oesophagien, sténose duodénale) c'est une gastrojéjunostomie qui sera installée, c'est-à-dire que le tube passe par l'estomac mais se rend plus loin dans la première partie du petit intestin.

Y a-t-il des risques liés à la gastrostomie/gastrojéjunostomie ?

Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé :

- Irritation de la paroi abdominale
- Infection du point de ponction.
- Saignement ou hématome.
- Douleurs abdominales jusqu'à 24-48 h après l'intervention.

Retour à la maison

- Vous devez vous reposer 24 heures.
- Vous devez garder le pansement 24 heures.
- Vous ne devez pas effectuer d'exercices physiques intenses dans les 48 heures suivant l'intervention.
- Vous devrez revenir une semaine après l'installation pour le retrait des points d'ancrages. Votre rendez-vous vous sera donné par l'imagerie médicale.

Contactez-nous immédiatement au **450 468-8111 poste 86495** si :

- Si vous avez de la fièvre ou des frissons dans les 24 heures suivant l'examen.
- Si la douleur au point d'insertion va en augmentant.
- Si le drain est arraché ou brisé.
- Si le drain est bloqué ou coule au point de ponction.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cisssme



400-3552