

Ponction / drainage pleural

Instructions en lien avec la médication

Instructions précises concernant vos médicaments, y compris les médicaments pour le diabète, les anticoagulants ou les allergies.

Si vous prenez:

■ de la *Warfarine*, également appelée *Coumadin*®, *Xarelto* ou autres anti-coagulants:

Votre médecin traitant vous demandera de les arrêter avant l'examen (le nombre de jours dépend du type de médication que vous prenez). Il pourrait vous prescrire un autre médicament à prendre pendant cette période. Si votre médecin vous prescrit de l'héparine sous-cutanée: vous devez la cesser 24 heures avant votre examen.

■ des antiplaquettaires, tel que le *Plavix*:

Votre médecin traitant vous demandera de les cesser 5 jours avant l'examen.

Le reste de la médication usuelle doit être poursuivie normalement.

Le matin de l'examen

- ➔ Prendre un petit déjeuner léger.
- ➔ Vous devez vous présenter en médecine de jour (MDJ) au 1^{er} étage, à 7 h 30, avec votre carte d'hôpital, votre carte d'assurance maladie et votre liste de médicaments à jour.
- ➔ Vous devez être disponible toute la journée.
- ➔ Ne pas oublier d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison.

Le déroulement de l'examen

LE DRAINAGE PLEURAL COMPREND 4 ÉTAPES PRINCIPALES:

- 1 Sous anesthésie locale, ponction de la peau et avancée de l'aiguille jusqu'à l'enveloppe du poumon (plèvre) sous guidage échographique.
- 2 Insertion du drain entre les deux membranes de la plèvre (où se trouve le liquide).
- 3 Aspiration du liquide présent entre les deux plèvres (lorsque demandé par le médecin traitant, un prélèvement peut être pris pour analyses en laboratoire).
- 4 Lorsque l'aspiration du liquide est terminée, retrait du drain et installation d'un pansement.

Qu'est-ce qu'un drain ?

Un drain est un cathéter (tube en plastique souple) dont le bout en J se retrousse comme un tire-bouchon. L'extrémité est trouée afin de permettre au liquide de s'évacuer. Le bout en J se retrouve entre les deux feuillets de la plèvre et le reste du drain se trouve à l'extérieur du corps pour collecter le liquide.

Y a-t-il des risques liés au drainage pleural ?

Toutes interventions présentent certains risques dont vous devez être informé :

- Toux temporaire (s'estompe dans les minutes suivant l'intervention).
- Douleur au site de ponction.
- Saignement et/ou hématome au site de ponction.
- Infection du site de ponction.

Retour à la maison

- Garder le pansement 24 h.
- Il est important de garder le pansement sec et propre en tout temps pour éviter les risques d'infection.

Contactez-nous immédiatement au 450 468-8111 poste 86495 si :

- Si vous avez de la fièvre ou des frissons 24 heures suivant l'intervention.
- Si la douleur au point de ponction va en augmentant.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Est

Québec



santeme.quebec



facebook.com/cissme



400-3559