

### Renseignements à l'intention des usagers

#### Indication

La Dexrazoxane vous a été prescrite pour diminuer les dommages possibles qui pourraient être causés par un médicament qui a fui hors de votre veine lors de votre traitement et qui s'est retrouvé sous votre peau.



#### Effets indésirables de la Dexrazoxane

Nausées, vomissements et diarrhée, fatigue, anorexie, ulcères dans la bouche, douleur au point d'injection. Cependant, la plupart des effets semblent être associés à votre traitement plutôt qu'à la Dexrazoxane elle-même.

#### Dans les plus brefs délais

Vous devez contacter votre équipe de soins si vous notez :

- une augmentation ou l'apparition de douleur;
- une augmentation ou l'apparition de rougeur;
- l'apparition de démangeaison;
- la présence d'une lésion cutanée (ampoule);
- la rupture de votre peau;
- la présence d'un écoulement;
- une enflure;
- une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras qui a subi l'extravasation.

Présentez-vous sans attendre à l'urgence si vous avez de la température buccale plus élevée que 38,3 °C (101 °F) une seule fois ou supérieure ou égale à 38 °C (100,4 °F) pendant plus d'une heure.

#### Remarques

- Il est essentiel d'informer votre médecin et votre pharmacien si vous êtes suivi ou traité pour un mauvais fonctionnement du foie ou des reins, si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir ou si vous allaitez.
- Ne pas oublier d'informer votre médecin et votre pharmacien des médicaments que vous prenez, y compris les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

#### Production

© CISSS de la Montérégie-Centre  
Édition : juillet 2021