

FICHE DE SUIVI FIÈVRE

Si vous appelez Info-Santé (8-1-1, option 1) ou que vous devez consulter un professionnel de la santé, assurez-vous d'avoir cette feuille complétée avec vous.



Journée	Heure	Température (Celsius ou Fahrenheit)	Médicament (Avez-vous donné de l'acétaminophène par ex. <i>Tempra</i> , Tylenol ou de l'ibuprophène par ex. <i>Advil</i> , Motrin?) Respectez toujours la quantité et la fréquence indiquées!	Observations (notes sur l'état général de l'enfant)
<i>Mardi, 7 sept.</i>	<i>17 h 20</i>	<i>39,3 C</i>	<i>Acétaminophène</i>	<i>De bonne humeur, mais il n'a pas d'appétit.</i>

COMMENT PRENDRE LA TEMPÉRATURE?

Il existe 4 moyens, **en fonction de l'âge de votre enfant**, de prendre la température : rectal (rectum), buccal (bouche, sous la langue), axillaire (aisselle) et tympanique (oreille).

- De la naissance à 2 ans : rectum (1er choix), aisselle (2e choix)
- De 2 à 5 ans : rectum (1er choix), oreille ou aisselle (2e choix)
- Plus de 5 ans : bouche ou rectum (1er choix), oreille ou aisselle (2e choix)

VOTRE ENFANT FAIT DE LA FIÈVRE SI SA TEMPÉRATURE EST ÉGALE OU PLUS GRANDE QUE :

- Rectale : 38,0 C ou 101,5 F
- Buccale : 38,0 C ou 100,4 F
- Axillaire : 37,5 C ou 99,0 F
- Tympanique : 38,0 C ou 100,4 F

