

Tableau des consignes PCI en cas de suspicion de Covid-19 ou confirmé pour les RAC, RI (10 usagers et plus) de la DPD et DPSMD ainsi que pour le CRD Hébergement.

USAGER	RECOMMANDATIONS	DURÉE DE L'ISOLEMENT À LA CHAMBRE	CONSIGNES QUANT À L'ISOLEMENT	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (EPI)
USAGER COVID POSITIF Sa chambre est considérée comme ZONE CHAUDE	<p>Isolement à la chambre de 5 jours minimum pour l'utilisateur COVID positif. (À partir du début des symptômes ou date du test de dépistage COVID-19 positif si absence de symptômes).</p> <p>Lors des soins reçus, l'utilisateur doit porter le masque de procédure s'il est en mesure de le faire.</p> <p>Surveillance des symptômes avec prise de température pendant 10 jours.</p> <p>Effectuer la désinfection terminale de sa chambre lorsque l'utilisateur est considéré rétabli.</p> <p>*Si d'autres usagers ont la COVID-19, et qu'il est difficile de respecter les précautions additionnelles, le milieu devient zone chaude. Idéalement, terminer les soins par les usagers positifs.</p>	<p>Après ces 5 jours d'isolement, si les symptômes de l'utilisateur s'améliorent depuis 24h et qu'il a absence de fièvre depuis 48 h sans prise d'antipyrétiques, il peut reprendre ses activités à condition que l'utilisateur soit en mesure de respecter les consignes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porter un masque lors de toute interaction sociale. • Éviter d'être en contact avec des personnes vulnérables. • Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels. • Garder ses distances avec les autres, autant que possible. <p>Si l'utilisateur ne remplit pas toutes les conditions mentionnées ci-haut, nous recommandons de poursuivre l'isolement pour les 5 jours suivants. Pourquoi ? Parce qu'une personne ayant la COVID-19 demeure contagieuse jusqu'à 10 jours.</p>	<p>Avoir un employé dédié à l'utilisateur positif OU l'utilisateur symptomatique (si c'est possible).</p> <p>Si possible, une salle de bain dédiée à l'utilisateur positif OU l'utilisateur symptomatique. Sinon, désinfecter la salle de bain après chaque utilisation. (Le port d'EPI complet est requis pour l'intervenant, lors de l'accompagnement de l'utilisateur et la désinfection de la salle de bain)</p> <p><u>SI L'ISOLEMENT À LA CHAMBRE EST DIFFICILE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Privilégier une période de repas alternative (avant ou après les autres) pour limiter les contacts. • Lorsque l'utilisateur sort de sa chambre, il doit porter un masque de procédure et tenter de maintenir une distance avec les autres usagers. • Effectuer des sorties de façon alternée (pas en même temps que les autres usagers) et désinfection des surfaces suite au passage de l'utilisateur dans une pièce, ainsi que le matériel qu'il peut avoir touché. Privilégier l'utilisation de matériel dédié à l'utilisateur. • Encourager l'hygiène des mains de l'utilisateur avant de sortir de sa chambre et plus souvent, au besoin. 	<p><u>Port des EPI complets</u> Le masque de type N-95, une protection oculaire, la blouse à manches longues et les gants en contact avec l'utilisateur symptomatique ou son environnement OU lors d'un contact avec l'utilisateur Covid durant les 10 jours de la maladie et ce, même si l'utilisateur vaque à ses occupations du jour #6 au jour #10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En RI le port du masque minimal requis est le masque de procédure niveau 2. <p>Pour l'EPI, il est important de procéder à l'hygiène des mains avant de le revêtir et aussi entre chaque étape de son retrait.</p> <p>Renforcer les pratiques de base en PCI : Étiquette respiratoire et la fréquence de l'hygiène des mains pour tous (employés, usagers).</p> <p>Augmenter la désinfection des surfaces régulièrement touchées (plusieurs fois par jour) dans la ressource selon la situation d'éclosion.</p> <p>Aérer souvent le milieu en ouvrant une fenêtre, surtout dans les espaces communs.</p>
USAGER SYMPTOMATIQUE Sa chambre est considérée comme ZONE TIÈDE	<p><u>Isolement à la chambre dès l'apparition de symptômes</u></p> <p>Dépistage : s'assurer du consentement pour le dépistage</p> <p>TDAR</p> <p>1) Faire un premier test rapide.</p> <p>2) Si le résultat est négatif, faire un deuxième test 48 h plus tard.</p> <p>OU</p> <p>TAAN (selon le corridor de service du milieu)</p> <p>1) Faire un dépistage. Un TAAN est suffisant pour écarter la Covid-19</p> <p>2) si des symptômes respiratoires persistent, envisagez faire une demande médicale</p>	<p>Pour lever l'isolement suite à l'obtention de résultats de dépistage négatifs, l'utilisateur doit répondre aux critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures et absence de fièvre depuis 48 heures sans prise d'antipyrétique. <p>Pour la durée des symptômes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porter un masque lors de toute interaction sociale. • Éviter d'être en contact avec des personnes vulnérables. • Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels. • Garder ses distances avec les autres, autant que possible. 		

USAGER	RECOMMANDATIONS	ISOLEMENT DOMICILIAIRE (SELON LES MILIEUX FRÉQUENTÉS)	CONSIGNES QUANT À L'ISOLEMENT	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (EPI)
USAGER CAS CONTACT ÉTROIT	<p>Seulement les personnes qui habitent sous le même toit que la personne positive sont considérées des cas contacts étroits.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAC tous les usagers du milieu • RI et CRD les co-chambres. <p>Pour ces usagers, le test de dépistage est non requis et il n'y a pas d'isolement préventif à la chambre, à moins que l'utilisateur présente des symptômes.</p> <p>La période de surveillance est de 7 jours après la dernière exposition avec un cas confirmé.</p> <p>Pendant cette période:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance accrue des symptômes • Respecter une distanciation physique autant que possible. 	<p>Pour la fréquentation des milieux communautaires, scolaires ou autres, il faut s'informer auprès des partenaires externes sur leurs critères de retour pour un usager cas contact et suivre leurs règles pour le retour aux activités.</p>	<p>Pas d'isolement à la chambre, à moins que l'utilisateur présente des symptômes.</p> <p>En présence d'un usager « contact étroit de la même chambre », celui-ci doit pour une période de 7 jours après la dernière exposition d'un cas confirmé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porter un masque lors de toute interaction sociale. • Éviter d'être en contact avec des personnes vulnérables. • Éviter de participer à des événements sociaux non essentiels • Garder ses distances avec les autres, autant que possible. 	<p>Le masque de type N-95 et une protection oculaire en présence des usagers sont requis pour la période de surveillance des usagers contacts étroits.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En RI le port du masque minimal requis est le masque de procédure niveau 2. <p>Rehaussement des mesures PCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène des mains plus fréquentes pour tous. • Augmenter la désinfection des surfaces régulièrement touchées plusieurs fois par selon la situation d'écllosion.